English

Hindi

Marathi

Gujarati

Punjabi

FAVORATE

Novaluron 5.25% Indoxacarb 4.5% w/w SC Insecticide

Read Leaflet Before Use.

Novaluron 5.25% + Indoxacarb 4.5% w/w SC is used on Tomato for the control of Helicoverpa armigera and Spodoptera litura, on Soyabean to control Spodoptera litura, Helicoverpa armigera & semi looper, on Pigeon pea to control Pod borer complex Helicoverpa armigera, Maruca obtuse, on Black gram to control Black gram pod borer complex Helicoverpa armigera, Etiella zinckenella, Maruca vitrata, on Chilli to control Helicoverpa armigera, Leaf eating caterpillar, Spodoptera litura, on Rice to control Leaf folder Cnaphalocrocis medinalis, on Groudnut to control Helicoverpa armigera & Spodoptera litura.

Chemical Composition:

Novaluron a.i.	5.25 % w/w
Indoxacarb a.i.	4.50 % w/w
Dimethyl sulphoxide	7.80 % w/w
Polyethylene glycol	7.20 % w/w
Propylene glycol	2.00 % w/w
Xanthum gum	9.70 % w/w
1,2-Benzisothiazoline-3-one	0.05 % w/w
Soft water	QS %
Total	100.00% w/w

Recommendation:

Crop	Common name of the pest	Dosage/ha		Dilution in water (litre)	Waiting period between last spray to harvest (days)
		a.i. (g)	Formulation (ml)		
Tomato	Fruit Borer (Helicoverpa armigera) and Leaf eating caterpillar (Spodoptera Litura)	43.31 + 37.13 - 45.94 + 39.38	825 - 875	500	5
Soybean	Spodopetra litura, Helicoverpa armigra and Semilooper	43.31 + 37.13- 45.94 + 39.38	825 - 875	500	14
Pigeon pea	Pod border complex (Helicoverpa armigera, Maruca obtuse)	43.31 + 37.13- 45.94 + 39.38	825 - 875	500	25
Black gram	Black gram pod borer complex (Etiella zinckenella, Spodoptera litura Maruca vitrata)	43.31 + 37.13- 45.94 + 39.38	825 - 875	500	14
Chilli	Fruit borer complex (Helicoverpa armigera, Spodoptera litura)	43.31 + 37.13- 45.94 + 39.38	825 - 875	500	7
Rice	Leaf folder (Cnaphalocrocis medinalis)	22.97+ 19.69	437.5	500	40
Groundnut	Helicoverpa armigera & Spodoptera litura	45.94 + 39.38	875	500	34

Good practices relating to pesticide application techniques

Direction of use: Take the measured quantity of insecticide and add to it a small quantity of water. Stir thoroughly using a stick or rod and then add remaining quantity of water, stir well to form final spray solution.

Weather condition (In general): Not to be used during unfavorable conditions.

Soil and water (where ever applicable): Light to heavy soil. Clean water to be used for spray.

Crop stage for application:

Application Technique: Foliar application

Equipment Type: Knapsack sprayer, Foot sprayer, Compression knapsack sprayer or motorised sprayer fitted with high volume nozzles.

Nozzle Type: High volume nozzles.

Dosage: As per recommendation.

Instruction for Mixing: Take the measured quantity of insecticide and add to it a small quantity of water. Stir thoroughly using a stick or rod and then add remaining quantity of water, stir well to form final spray solution.

Re-entry Period: 48 hours.

Manner and Time of application: As per direction of use.

Application Timings: Spray to be initiated, when pest's population reaches economic threshold level (ETL).

Frequency:

Stages during which pesticides should not be applied on any crop:

Precautions to be taken to avoid harm to the beneficial insects like honey bees and natural enemies of pests :

Symptoms of Poisoning: Inhalation may cause coughing, shortness of breath, chemical pneumonitis, lung oedema, bronchospasm. Ingestion may cause vomiting, nausea, diarrhea. In case of skin contact redness, oedema or dermatitis may occur. Eye contact may result in tears of redness, blurred vision. Reversible anaemia may occur.

First Aid Measures: If ingested: if person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induced vomiting until and unless desired by attending physician. If inhaled: Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration,Consult a physician. In case of skin contact: Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. In case of eye contact: Rinse gently with plenty of water at least for15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists. Consult eye specialist.

Antidote: No specific antidote, symptomatic and supportive therapy

Phytotoxicity: No phytotoxic when used as recommended.

Storage Conditions: 1. Insecticide shall be stored in separate rooms and premises away from the rooms and premises used for storing others articles particularly of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticide. 2. The rooms and the premises meant for storing the insecticides shall be well built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour.

Safety Precautions: 1.Keep away from foodstuffs, empty food stuff containers and animal food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3.Avoid inhalation of spray mist, Spray in direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat, and chew anything while spraying. 6. While mixing and spraying the insecticide, users must wear protective clothing like long sleeved shirt, long pants, chemical resistant gloves, shoes, goggle, hat and mask.

Cautionary Statement: 1. not to be used on crops other than mentioned on label & leaflets. 2. product is highly toxic to fish and aquatic organisms and thus the product containing the molecules may be avoided near aquaculture.

Disposal of used containers, washing from equipment and surplus material: 1.It shall be the duty of manufacturers, formulators of insecticides and operators to dispose packages or surplus materials and washing in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. The packages shall be broken and buried away from habitation.

" DANGEROUS TO RE USE EMPTY CONTAINER "

फेवरेट

नोवाल्यूरॉन ५.२५% + इंडोक्साकार्ब ४.५% भा / भा एस. सी. कीटनाशक

इस्तेमाल से पहले संलग्न पत्रिका पढ़े ।

नोवलुरोन ५.२५% + इंडोक्साकार्ब ४.५% भा / भा एस सी का उपयोग टमाटर पर हेलिकोवर्पा आर्मिगेरा और स्पोडोप्टेरा लिटुरा, सोयाबीन पर स्पोडोप्टेरा लिटुरा, हेलिकोवर्पा आर्मिगेरा और सेमी लूपर, अरहर पर पॉड बोरर कॉम्प्लेक्स हेलिकोवर्पा आर्मिगेरा, मारुका ओबट्यूस, उड़द पर उरद की फली बोर कॉम्प्लेक्स, हेलिकोवर्पा आर्मिगेरा, इटीयला जिंकनेल्ला, मारुका वीटराटा, मिर्च पर फल छेदक, हेलिकोवर्पा आर्मिगेरा, स्पोडोप्टेरा लिटुरा, धान पर पत्ती लपेटक, नाफलोक्रोसिस मेडिनालिस, मूंगफली पर हेलिकोवर्पा आर्मिगेरा और स्पोडोप्टेरा लिटुरा के नियंत्रण के लिए किया जाता है।

रासायनिक संरचना:

नोवाल्यूरॉन स. त.	५.२५% भा / भा
इंडोक्साकार्ब स.त.	४.५०% भा / भा
डाइमिथाइल सल्फोक्साइड	७.८०% भा / भा
पोलिईथाइलीन ग्लायकोल	७.२०% भा / भा
प्रोपाइलीन ग्लायकोल	२.००% भा / भा
जैन्थम गोंद	९.७०% भा / भा
१.२ बेन्झीसोथियाझोलिन - ३ वन	०.०५% भा / भा
नरम जल	पर्याप्त मात्रा %
कुल	१००.००% भा / भा

सिफारिश:

फ़सल	कीड़ों के सामान्य नाम	खुराक प्रति हैक्टर		पानी की मात्रा (ली.)	फसल कटाई से पूर्व का अन्तराल (दिन)
		सक्रीय तत्व (ग्रा.)	संरचना (मिली)		
टमाटर	हेलिकोवर्पा आर्मिगेरा और स्पोडोप्टेरा लिटुरा	43.31 + 37.13 - 45.94 + 39.38	825 - 875	500	5
सोयाबीन	स्पोडोप्टेरा लिटुरा, हेलिकोवर्पा आर्मिगेरा और सेमी लूपर	43.37 + 37.13 - 45.94 + 39.38	825 - 875	500	14
अरहर	पॉड बोरर कॉम्प्लेक्स (हेलिकोवर्पा आर्मिगेरा, मारुका ओबट्यूस)	43.37 + 37.13 - 45.94 + 39.38	825 - 875	500	25
उरद	उरद की फली बोर कॉम्प्लेक्स (हेलिकोवर्पा आर्मिगेरा, इटीयला जिंकनेल्ला, स्पोडोप्टेरा लिटुरा और मारुका वीटराटा)	43.37 + 37.13 - 45.94 + 39.38	825 - 875	500	14
मिर्च	फल छेदक (हेलिकोवर्पा आर्मिगेरा, स्पोडोप्टेरा लिटुरा)	43.37 + 37.13 - 45.94 + 39.38	825 - 875	500	7
धान	पत्ती लपेटक (नाफलोक्रोसिस मेडिनालिस)	22.97+ 19.69	437.5	500	40
मूंगफली	हेलिकोवर्पा आर्मिगेरा, स्पोडोप्टेरा लिटुरा	45.94 + 39.38	875	500	34

कीटनाशक अनुप्रयोग तकनीकों से संबंधित अच्छे अभ्यास:

उपयोग के लिए निर्देश: कीटनाशी की अपेक्षित मात्रा लें. उसे थोड़े से पानी में मिलायें, छड़ी या छड़ की सहायता से जोर से मिलायें। अब पानी की शेष मात्रा मिला दें। खूब अच्छी तरह मिला लें। तो स्प्रे का सल्यूशन घोल बन जाएगा।

मौसम की स्थिति: प्रतिकूल दशाओं के दौरान इस्तेमाल न करें।

मिट्टी और पानी: हल्की से भारी मिट्टी तक के लिए। छिड़काव के लिए साफ पानी का इस्तेमाल करें।

फसल अवस्था:

आवेदन तकनीक: पत्तो पर उपयोग के लिए।

उपकरण प्रकार: नैपसैक स्प्रेयर, फुट स्प्रेयर, कम्प्रेशन नैपसैक स्प्रेयर या मोटोराइज्ड स्प्रेयर फिटेड हाई वॉल्यूम नोज़ेल्स के साथ

नोजल प्रकार: हाई वॉल्यूम नोज़ेल्स

खुराक: खुराक विवरण के लिए कृपया उपरोक्त तालिका देखें।

मिश्रण के लिए निर्देश: कीटनाशी की अपेक्षित मात्रा लें. उसे थोड़े से पानी में मिलायें, छड़ी या छड़ की सहायता से जोर से मिलायें। अब पानी की शेष मात्रा मिला दें। खूब अच्छी तरह मिला लें। तो स्प्रे का सल्यूशन घोल बन जाएगा।

पुन: प्रवेश अवधि: ४८ घंटे

आवेदन का समय और तरीका: उपयोग की दिशा के अनुसार

आवेदन का समय: स्प्रे तब शुरू करना चाहिए, जब कीटों की आबादी इकॉनामिक थ्रेशोल्ड लेवल (ईटीएल) तक पहुँचे।

अधिक से अधिक अंक सहित आवृत्ति:

चरण जिसके दौरान किसी भी फसल पर कीटनाशक नहीं लगाया जाना चाहियें:

शहद की मक्खियों और कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं जैसे लाभकारी कीड़ों से नुकसान से बचने के लिए बरती जाने वाली सावधानियां:

विष के लक्षण: साँस में जाने पर खाँसी, साँस लेने में कष्ट, रासायनिक निमोनिया शोध, फेफड़ों का शोध, श्वास नली का संकुलन हो सकता है. पेट में जाने पर वमन, मितली, जुलाब हो सकता है। त्वचा से संपर्क होने पर लालिमा, शोथ या त्वचा घाव हो सकते है। आँख से संपर्क होने पर लालिमा या आंसू. धुंधला दिख सकता है. प्रतिवर्ती निमोनिया हो सकता है।

पादप आविषालुता: सिफारिशी मात्रा पर कोई पौध विशाक्तता नहीं होती।

प्राथमिक उपचार: अगर मुह निगला लिया है: यदि व्यक्ति सचेत और सतर्क हैं, तो पानी से मुंह कुल्ला कराये और पीने के लिए 1 या 2 गिलास पानी दें। एक बेहोश व्यक्ति को मुंह से कुछ भी कभी नहीं दे। डॉक्टर को बुलाएं। बिना उपस्थित चिकित्सक की सलाह उल्टी न कराये। यदि साँस लेना: रोगी को ताजी हवा में ले जाएं और शरीर के तापमान का ख्याल रखें। यदि रोगी साँस नहीं ले रहा है या कठिनाई से साँस ले रहा है, तो कृत्रिम श्वसन दें, एक चिकित्सक से परामर्श करें। त्वचा के संपर्क के मामले में शरीर के प्रभावित हिस्से को अच्छी तरह से साबुन से धोएं और बालों और नाखूनों सहित पानी का खूब इस्तेमाल करें। यदि दर्द, लालिमा या जलन बनी रहती है, तो डॉक्टर से परामर्श करें। सभी दूषित कपड़ों को अलग किया जाना चाहिए और उपयोग से पहले साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोना चाहिए। आंखों के संपर्क के मामले में कम से कम 15 मिनट के लिए बहुत सारे पानी से धीरे-धीरे धोएं। यदि दर्द, जलन, लालिमा या फोटोफोबिया बनी रहती है तो नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह लें।

विष नाशक: कोई विशिष्ट विषहर औषध नहीं है, लाक्षणिक उपचार करें रोगसूचक और सहायक चिकित्सा करें।

संग्रहण की शर्ते : १. कीटनाशक डिब्बों की अन्य पदार्थ और खास कर खाद्य पदार्थ संग्रहीत किए हुए कमरे या जगह से दूर, अलग कमरे मे या अलग जगह पर या स्वतंत्र अलमारी मे ताला चाबी में बंद रखे। २. जिस कमरे या जगह में कीटनाशक का भण्डारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ सूखा, हवादार, प्रकाशमय तथा पर्याप्त लम्बा चौडा होना चाहियें। जिससे भाप प्रदूषण होने का भय न हों।

सुरक्षा के लिए सावधानियाँ: १. खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुंह, त्वचा और आँखों के सम्पर्क से बचायें। 3. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं। ५. छिड़काव के समय धुमपान, खाना पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६. कीटनाशक को मिलाते व छिड़कते समय आप पूरी बाँह की कमीज, पूरी पैन्ट, रसायन प्रतिरोधी दस्ताने, जूते, रंगीन चश्मे, टोपी हैट व नकाब अवश्य पहनें।

सावधानी कथन: १. पत्रिका व लेबल मे दिये हुये फसलों के अलावा अन्य के लिये उपयोगित नहीं है। २. यह उत्पाद मछली और जलीय जीवों के लिए अत्यधिक विषाक्त है, और इस प्रकार के अणुओं वाले उत्पाद को जलीय कृषि में और इसके आसपास उपयोग से बचना चाहिए।

कीटनाशक के प्रयोग किये गए डिब्बों, बचे हुही कीटनाशको तथा पात्रों के धोवन का निपटारा: १. यह कीटनाशकों के उत्पादकों, फॉर्म्यूलेटर्स तथा ऑपरेटर्स का कर्तव्य होगा कि डिब्बों या बची हुई सामग्रियों और धोवन का निपटान सुरक्षित तरीके से करें ताकि वातावरण या पानी प्रदूषित न हो. २. खाली डिब्बों को खुले में नहीं फेंकना चाहिए, ताकि उनका दोबारा इस्तेमाल न हो। 3. डिब्बों को तोड़फोड़ कर रिहायशी बस्ती से दूर जमीन में गाड़ दिया जाना चाहिए।

" खाली कंटेनर का दोबारा उपयोग करना खतरनाक है। "

फेवरेट

नोवालुरॉन 5.25% + इंडोक्साकार्ब 4.5% भा/भा एससी कीटकनाशक

वापरण्यापूर्वी माहिती पत्रक वाचा.

नोवालुरॉन ५.२५% + इंडोक्साकार्ब ४.५% भा/भा एससीचा वापर टोमॅटोवर हेलीकोवर्पा अर्मीगेरा आणि स्पोडोप्टेरा लिथुराच्या, सोयाबीनवर स्पोडोप्टेरा लिथुरा, हेलीकोवर्पा अर्मीगेरा आणि सेमी लुपरच्या काळ्या वाटाण्यावर शेंगा पोखरणाऱ्या क्लिष्ट हेलीकोवर्पा अर्मीगेरा, मारुका ओब्टूजच्या, हरभऱ्यावर हरभऱ्याच्या शेंगा पोखरणाऱ्या क्लिष्ट हेलीकोवर्पा अर्मीगेरा, एटिएल्ला झिंकनेल्ला, मारुका विट्राटाच्या, मिरचीवर हेलीकोवर्पा अर्मीगेरा, पाने खाणारी अळी, स्पोडोप्टेरी लिथुरा, तांदळावर पाने दुमडणाऱ्या नाफालोक्रोसिस मेडीनालीसच्या आणि भूईमूगावर हेलीकोवर्पा अर्मीगेरा आणि स्पोडोप्टेरा लिथुराच्या नियंत्रणासाठी केला जातो.

रासायनिक रचना:

नोवालुरॉन स.घ.	५.२५% भा/भा
इंडोक्साकार्ब स.घ.	४.५०% भा/भा
डायमीथाइल सल्फोक्साइड	७.८०% भा/भा
पॉलीएथीलीन ग्लायकोल	७.२०% भा/भा
प्रपीलीन ग्लायकोल	२.००% भा/भा
झांथन गम	९.७०% भा/भा
१,२-बेंझीसोथियाझोलाइन-३-वन	०.०५% भा/भा
मृदू पाणी	पुरेशा प्रमाणात%
एकूण	**१००.००% भा/भा**

शिफारस:

पीक	कीटकाचे सामान्य नाव	मात्रा/हेक्टर		पाण्यात सौम्यीकरण (लीटर)	शेवटची फवारणी आणि कापणीच्या दरम्यान थांबण्याचा कालावधी (दिवस)
		स.घ. (ग्रा)	मिश्रण (मिली)		
टोमॅटो	फळ पोखरणारी अळी (हेलीकोवर्पा अर्मीगेरा) आणि पाने खाणारी अळी (स्पोडोप्टेरा लिथुरा)	४३.३१ + ३७.१३- ४५.९४ + ३९.३८	८२५ - ८७५	५००	५
सोयाबीन	स्पोडोप्टेरा लिथुरा , हेलीकोवर्पा अर्मीगेरा आणि सेमी लुपर	४३.३१ + ३७.१३- ४५.९४ + ३९.३८	८२५ - ८७५	५००	१४
काळा वाटाणा	शेंग पोखरणारी क्लिष्ट अळी (हेलीकोवर्पा अर्मीगेरा, मारुका ओब्टूज)	४३.३१ + ३७.१३- ४५.९४ + ३९.३८	८२५ - ८७५	५००	२५
हरभरा	हरभऱ्याच्या शेंगा पोखरणाऱ्या क्लिष्ट (एटिएल्ला झिंकनेल्ला, स्पोडोप्टेरा लिथुरा, मारुका विट्राटा)	४३.३१ + ३७.१३- ४५.९४ + ३९.३८	८२५ - ८७५	५००	१४
मिरची	पोखरणारी क्लिष्ट (हेलीकोवर्पा अर्मीगेरा, स्पोडोप्टेरा लिथुरा)	४३.३१ + ३७.१३- ४५.९४ + ३९.३८	८२५ - ८७५	५००	७
तांदूळ	पाने दुमडणारी अळी (नाफालोक्रोसिस मेडीनालीस)	२२.९७+ १९.६९	४३७.५	५००	४०
भूईमूग	हेलीकोवर्पा अर्मीगेरा व स्पोडोप्टेरा लिथुरा	४५.९४ + ३९.३८	८७५	५००	३४

कीटकनाशक वापरण्याच्या तंत्राशी संबंधित चांगल्या पद्धती

वापरण्यासाठी निर्देश: कीटकनाशक मोजून घ्या आणि ते थोड्या पाण्यात टाका. काठी किंवा शीग वापरून चांगले ढवळा आणि नंतर राहिलेले पाणी टाका आणि फवारणीचे अंतिम द्रावण तयार होण्यासाठी ढवळा.

हवामान (सर्वसाधारण): प्रतिकुल परिस्थितीत वापरू नये.

माती आणि पाणी (जिथे लागू असेल): हलकी ते जड माती. फवारणीसाठी स्वच्छ पाणी वापरावे.

वापरासाठी पीकाचा टप्पा:

वापराचे तंत्र: पालवीवर फवारणी

उपकरणाचा प्रकार: नॅपसॅक स्प्रेयर, फूट स्प्रेयर, कॉम्प्रेशन नॅपसॅक स्प्रेयर किंवा मोटर लावलेला उच्च राशी नॉझल बसवलेला स्प्रेयर.

नॉझलचा प्रकार: उच्च राशी नॉझल.

मात्रा: शिफारशीनुसार

मिश्रणतयार करण्यासाठी सूचना: कीटकनाशक मोजून घ्या आणि ते थोड्या पाण्यात टाका. काठी किंवा शीग वापरून चांगले ढवळा आणि नंतर राहिलेले पाणी टाका आणि फवारणीचे अंतिम द्रावण तयार होण्यासाठी ढवळा.

पुन्हा प्रवेश कालावधी: ४८ तास.

वापरण्याची पद्धत आणि वेळ: वापरण्यासाठी निर्देशानुसार.

वापरण्याची वेळ: कीटकांची संख्या इकॉनॉमिक थ्रशोल्ड पातळीवर (इटीएल) पोचेल तेव्हा फवारणी सुरू करावी.

वारंवारता:

कोणत्याही पीकावर कीटकनाशकाचा वापर करू नये असे टप्पे:

मधमाशांसारखे लाभदायक कीटक आणि कीटकांच्या शत्रूंना हानी टाळण्यासाठी घ्यावयाची खबरदारी:

विषबाधेची लक्षणे: श्वासातून आत गेल्याने खोकला, श्वासावरोध, रासायनिक न्यूमोनीटीस, लंग ओडेमा, ब्रॅंकोस्पॅझम होऊ शकतो. पोटात गेल्याने उलट्या, मळमळ, अतिसार होऊ शकेल. त्वचेशी संपर्कात आल्यास लालसरपणा, ओडेमा किंवा डर्मेटीटीस होऊ शकतो. डोळ्याशी संपर्क आल्यास त्याचा परिणाम डोळे लाल होणे, धूसर दृष्टीत होऊ शकेल. रिव्हर्सिबल अनेमिया होऊ शकेल.

प्रथमोपचार: पोटात गेल्यास: व्यक्ती शुद्धीवर आणि सावध असेल तर, तोंड पाण्याने धुवा आणि १ किंवा २ ग्लास पाणी पिण्यास द्या. बेशुद्ध व्यक्तीला तोंडावाटे कधीही काहीही देऊ नका. डॉक्टरला बोलवा. लक्ष देणाऱ्या फिजिशियनने इच्छा व्यक्त करेपर्यंत आणि केल्याशिवाय उलटीला उद्युक्त करू नका. श्वासातून आत गेल्यास: रुग्णाला ताज्या हवेत हलवा आणि शरीराच्या तापमानाची काळजी घ्या. रुग्ण श्वासोश्वास करत नसेल तर, कृत्रिम श्वसन द्या, फिजिशियनचा सल्ला घ्या. त्वचेशी संपर्काच्या बाबतीत: केस आणि बोटांच्या नखांखालील शरीराचे बाधित अवयव साबण आणि पाण्याने चांगले धुवा. वेदना, लालसरपणा किंवा चुरचुर चालूच राहिली तर, डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. सगळे दूषीत कपडे वेगळे करावेत आणि पुन्हा वापरण्यापूर्वी साबण आणि पाण्याने वेगळे धुवावेत. डोळ्यांशी संपर्काच्या बाबतीत:किमान १५ मिनीटांसाठी भरपूर पाण्याने डोळ्यांवर हबके मारा. वेदना, लालसरपणा, चुरचुर किंवा फोटोफोबिया चालूच राहिला तर नेत्रतज्ज्ञाचा सल्ला घ्या.

प्रतिविष: विशिष्ट प्रतिविष नाही, लक्षणानुसार आणि साहाय्यक उपचार द्या.

वनस्पतीजन्य विषाक्तता: शिफारशीनुसार वापरले असता वनस्पतीजन्य विषाक्तता नाही.

साठवण्याच्या अटी: १. उत्पादन असलेली पॅकेजेस् अन्नपदार्थ वगैरे इतर वस्तू साठवण्यासाठी असलेल्या खोली किंवा जागेपासून दूर एका स्वतंत्र खोलीत किंवा जागेत साठवावीत किंवा उत्पादनाचे स्वरुप आणि राशी यावर अवलंबून कुलुप आणि किल्लीखाली एका स्वतंत्र कपाटात ठेवावीत. २. उत्पादन साठवण्यासाठी असलेल्या खोल्या किंवा जागा कोरड्या, चांगल्या बांधकामाच्या, भरपूर प्रकाश असलेल्या आणि हवेशीर आणि पुरेशा आकारमानाच्या असाव्यात.

सुरक्षाविषयक सावधगिरी: १. अन्नपदार्थ, अन्नपदार्थाचे रिकामे कंटेनर्स आणि पशूखाद्यापासून दूर ठेवा. २. तोंड, डोळे आणि त्वचेशी संपर्क टाळा. ३. फवाऱ्याचे तुषार श्वासातून आत जाणे टाळा. वाऱ्याच्या दिशेला फवारणी करा. ४. फवारणीनंतर दूषीत कपडे आणि शरीराचे अवयव चांगले स्वच्छ धुवा. ५. फवारणी करताना काहीही खाऊ, पिऊ किंवा चघळू नका आणि धूम्रपान करू नका. ६. मिश्रणतयार करताना आणि फवारताना लांब बाह्यांचा शर्ट, लांब पॅंट, रसायन विरोधक ग्लोवज्, शूज्, गॉगल्स, हॅट आणि मास्कसारखे संपूर्ण संरक्षक कपडे घाला.

सावधगिरीचा इशारा: १. लेबल आणि माहितीपत्राकत नमूद केलेल्या व्यतिरिक्त अन्य पीकांवर वापरू नये. २. उत्पादन मासे व जलचर प्राण्यांसाठी अत्यंत विषारी आहे आणि म्हणून रेणुयुक्त उत्पादने मत्स्यपालनाच्या जवळपास टाळावीत.

वापरलेल्या कंटेनर्सची, उपकरणांमधील चिंध्यांची आणि अधिकांश सामग्रीची विल्हेवाट: १. अधिकांश पॅकेजेस किंवा सामग्री आणि चिंध्या यांची पर्यावरणाच्या आणि पाण्याच्या प्रदूषणाला प्रतिबंध होईल अशा एका सुरक्षित पद्धतीने विल्हेवाट लावणे हे उत्पादनाचे निर्माते, मिश्रक आणि वापरकर्ते यांचे कर्तव्य असेल. २. वापरलेली पॅकेजेस् त्यांचा पुन्हा वापर टाळण्यासाठी इतस्ततः फेकू नयेत. ३. वापरलेली पॅकेजेस् मोडून तोडून वसाहतीपासून दूर पुरून टाकावीत.

" रिकामे कंटेनर पुन्हा वापरणे धोकादायक आहे."

ફેવોરેટ

નોવાલુરોન ૫.૨૫% + ઈન્ડોક્ઝાકાર્બ ૪.૫% વ/વ એસસી કીટકનાશક

વાપરતાં પહેલાં પત્રિકા વાંચો.

નોવાલુરોન ૫.૨૫% + ઈન્ડોક્ઝાકાર્બ ૪.૫% વ/વ એસસીનો ઉપયોગ ટામેટાં પર હેલિકોવેર્પા આર્મિગેરા અને સ્પોડોપ્ટેરા લિટુરા, સોયાબિન પર સ્પોડોપ્ટેરા લિટુરા, હેલિકોવેર્પા આર્મિગેરા અને સેમી લુપર, તુવેર પર ડખછેદક કૉમ્પ્લેક્સ હેલિકોવેર્પા આર્મિગેરા, મારુકા ઓબ્ટ્યુસ, કાળા ચણા પર કાળા ચણાની ડખછેદક કૉમ્પ્લેક્સ હેલિકોવેર્પા આર્મિગેરા, મરચાં પર હેલિકોવેર્પા આર્મિગેરા, પાંદડાં કોરી ખાતી ઇયળ, સ્પોડોપ્ટેરા લિટુરા, ડાંગર પર પર્ણવળિયાં નેફોલોક્રોસિસ મેડિનેઇલ્સ, મગફળી પર હેલિકોવેર્પા આર્મિગેરા સ્પોડોપ્ટેરા લિટુરાની રોકથામ કરવા માટે થાય છે.

રાસાયણિક સંયોજનઃ

નોવાલુરોન સ.ત.	૫.૨૫% વ/વ
ઈન્ડોક્સાકાર્બ સ.ત.	૪.૫૦% વ/વ
ડાઈમિથાઈલ સલ્ફોક્સાઈડ	૭.૮૦% વ/વ
પૉલીઇથાઇલીન ગ્લાયકોલ	૭.૨૦% વ/વ
પ્રોપીલીન ગ્લાયકોલ	૨.૦૦% વ/વ
ઝાન્થમ ગમ	૯.૭૦% વ/વ
૧,૨-બેન્ઝીસોથિઆઝોલાઇન-૩-વન	૦.૦૫% વ/વ
નરમ પાણી	પૂરતા પ્રમાણમાં %
કુલ	**૧૦૦.૦૦% વ/વ**

ભલામણઃ

પાક	કીટકનું સામાન્ય નામ	માત્રા/હેક્ટર		પાણીની માત્રા (લીટર)	અંતિમ છંટકાવ અને લણણી વચ્ચેને પ્રતીક્ષાગાળો (દિવસો)
		સ.ત. (ગ્રા)	ફૉર્મ્યુલેશન (મિલી)		
ટામેટાં	ફળછેદક (હેલિકોવેર્પા આર્મિગેરા) અને પાંદડા કોરી ખાતી ઇયળ (સ્પોડોપ્ટેરા લિટુરા)	૪૩.૩૧ + ૩૭.૧૩- ૪૫.૯૪ + ૩૯.૩૮	૮૨૫ - ૮૭૫	૫૦૦	૫
સોયાબીન	સ્પોડોપ્ટેરા લિટુરા, સ્પોડોપ્ટેરા લિટુરા, (હેલિકોવેર્પા આર્મિગેરા મારુકા ઓબ્ટ્યુસ)	૪૩.૩૧ + ૩૭.૧૩- ૪૫.૯૪ + ૩૯.૩૮	૮૨૫ - ૮૭૫	૫૦૦	૧૪
તુવેર	ડખછેદક કૉમ્પ્લેક્સ હેલિકોવેર્પા આર્મિગેરા, મારુકા ઓબ્ટ્યુસ	૪૩.૩૧ + ૩૭.૧૩- ૪૫.૯૪ + ૩૯.૩૮	૮૨૫ - ૮૭૫	૫૦૦	૨૫
કાળા ચણા	કાળા ચણાની ડખછેદક કૉમ્પ્લેક્સ હેલિકોવેર્પા આર્મિગેર (એટીએલા ઝીંકિનેલા, સ્પોડોપ્ટેરા લિટુરા મારુકા વિટ્રાટા)	૪૩.૩૧ + ૩૭.૧૩- ૪૫.૯૪ + ૩૯.૩૮	૮૨૫ - ૮૭૫	૫૦૦	૧૪
મરચાં	ફળછેદક કૉમ્પ્લેક્સ હેલિકોવેર્પા આર્મિગેરા, સ્પોડોપ્ટેરા લિટુરા	૪૩.૩૧ + ૩૭.૧૩- ૪૫.૯૪ + ૩૯.૩૮	૮૨૫ - ૮૭૫	૫૦૦	૭
ડાંગર	પર્ણવળિયાં (નેફોલોક્રોસિસ મેડિનેઇલ્સ)	૨૨.૯૭+ ૧૯.૬૯ ૪૦		૪૩૭.૫	૫૦૦
મગફળી	હેલિકોવેર્પા આર્મિગેરા સ્પોડોપ્ટેરા અને લિટુરા	૪૫.૯૪ + ૩૯.૩૮	૮૭૫	૫૦૦	૩૪

કીટકનાશકના છંટકાવની રીત સંબંધિત ઉત્તમ પ્રથાઓ

વપરાશ સંબંધિત માર્ગદર્શનઃ કીટકનાશકની માપેલી માત્રાને લઇને એને થોડા પાણીમાં ઉમેરો. લાકડી અથવા સળિયા વડે એને સારી રીતે હલાવો અને પછી બાકીનું પાણી એમાં ઉમેરી દો. અંતિમ છંટકાવ બનાવવા માટે એને સારી રીતે હલાવો.

હવામાનની પરિસ્થિતિ (સર્વસાધારણપણે): વિપરીત પરિસ્થિતિઓ દરમિયાન વાપરશો નહીં.

માટી અને પાણી (જ્યાં લાગુ થવાપાત્ર હોય) : હળવીથી ભારે માટી. છંટકાવ માટે ચોખ્ખું પાણી વાપરો.

છંટકાવ માટે પાકનો તબક્કોઃ

છંટકાવની રીતઃ પાંદડાં પર છંટકાવ કરો

ઉપકરણનો પ્રકારઃ નેપસેક સ્પ્રેયર, પાદચાલિત સ્પ્રેયર, હવાના દબાણથી ચાલતું સ્પ્રેયર અથવા હાઇ વૉલ્યુમ નાળચું બેસાડેલું મોટરચાલિત સ્પ્રેયર.

નાળચાનો પ્રકારઃ હાઇ વૉલ્યુમ નાળચું.

માત્રાઃ ભલામણ કર્યા મુજબ

મિશ્રણ કરવા માટેની સૂચનાઃ કીટકનાશકની માપેલી માત્રા લો અને એને થોડા પાણીમાં ઉમેરો. લાકડી અથવા સળિયા વડે એને સારી રીતે હલાવો અને પછી બાકીનું પાણી એમાં ઉમેરી દો. અંતિમ છંટકાવ બનાવવા માટે એને સારી રીતે હલાવો.

પુનઃ પ્રવેશ માટેની મુદતઃ ૪૮ કલાક

છંટકાવ કરવાની રીત અને સમયઃ વપરાશ કરવા માટેના માર્ગદર્શન અનુસાર.

છંટકાવ કરવા માટેનો સમયઃ જ્યારે કીટકોની માત્રા ચરમ સીમાએ પહોંચી જાય ત્યારે છંટકાવ કરો.

ફ્રિક્વન્સીઃ

કોઈ પણ પાક પર કીટકનાશકોનો ઉપયોગ ના કરવા માટેનો તબક્કોઃ

મધમાખીઓ અને કીટકોના કુદરતી દુશ્મનો જેવા જંતુઓને હાનિ થતી ટાળવા માટે લેવાં જોઈતાં તકેદારીના પગલાંઃ

ઝેર ચઢ્યાનાં લક્ષણોઃ જો શ્વાસમાં જાય તો ખાંસી, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ, કેમિકલ ન્યૂમોનાઇટિસ, ફેફસાંમાં જકડણ, બ્રોન્કોસ્પાઝમ. જો પેટમાં જાય તો ઊલટી, ઉબકા, ઝાડા. જો ત્વચાને લાગે તો લાલાશ, શોથ અથવા ત્વચારોગ થઈ શકે છે. જો આંખમાં જાય તો આંસુ, લાલાશ, આંખે ઝાંખપ અને રિવર્સિબલ એનીમીઆ થઈ શકે છે.

પ્રાથમિક ઉપચારઃ જો પેટમાં જાય તોઃ જો વ્યક્તિ ભાનમાં અને જાગૃત હોય તો એને પાણીના કોગળા કરાવો અને ૧થી ૨ ગ્લાસ પાણી પીવડાવો. બેભાન વ્યક્તિને કદાપિ મોં વાટે કંઈ પણ ના આપશો ડૉક્ટરને બોલાવો. જો સારવાર કરનારો ડૉક્ટર ના કહે ત્યાં સુધી ઊલટી કરાવશો નહીં. જો શ્વાસમાં જાય તોઃ દરદીને તાજી હવામાં ખસેડો અને એના શરીરના તાપમાનની કાળજી લો. જો દરદી શ્વાસ ના લઈ રહ્યો હોય અથવા એને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડતી હોય તો એને કૃત્રિમ શ્વાસ આપો. ડૉક્ટરની સલાહ લો. જો ત્વચાને લાગે તોઃ વાળ અને નખની નીચેના ભાગ સહિત શરીરના દુષિત અંગોને સાબુ અને પુષ્કળ પાણી વડે સારી રીતે ધોઈ નાંખો. જો દુઃખાવો, લાલાશ અથવા બળતરા ચાલુ રહે તો ડૉક્ટરની સલાહ લો. દુષિત થયેલાં બધાં કપડાંને ફરી વાર વાપરતાં પહેલાં એને અલગથી પાણીમાં પલાળીને સાબુ અને પાણી વડે સારી રીતે ધોઈ નાંખો. જો આંખમાં જાય તોઃ ઓછામાં ઓછી ૧૫ મિનિટ સુધી આંખોમાં પાણીની છાલક મારીને આંખાને ધૂઓ. જો દુઃખાવો, બળતરા, લાલાશ અથવા ફોટોફોબિયા ચાલુ રહે તો આંખના નિષ્ણાત ડૉક્ટરની સલાહ લો.

ઝેરનું મારણઃ ઝેરનું કોઈ ચોક્કસ મારણ નથી. લક્ષણો અનુસાર અને સહાયક ઉપચાર કરો

છોડવા માટે ઝેરીઃ જો ભલામણ કર્યા મુજબ વાપરવામાં આવે તો એ છોડ માટે ઝેરી નથી.

સંગ્રહ કરવાની પરિસ્થિતિઃ કીટકનાશકનો સંગ્રહ અલગ જ ઓરડા અથવા જગ્યામાં અન્ય ચીજવસ્તુઓ અને ખાસ કરીને ખાદ્યપદાર્થો રાખવાની જગ્યાથી દૂર કીટકનાશકના જથ્થા અને પ્રકાર અનુસાર અલગ જ કબાટમાં તાળુંચાવી વાસીને કરવો. ૨. કીટકનાશકની જગ્યા કે ઓરડો મજબૂત, સૂકો, હવાઉજાસવાળો અને એમાંથી નીકળતી બાષ્પથી પ્રદુષિત ના થાય એ માટે પૂરતો મોકળો હોવો જોઈએ.

સલામતનીની તકેદારીઓઃ ૧. ખાદ્યપદાર્થો, ખાદ્યપદાર્થો રાખવાના ખાલી વાસણો અને પશુઓના ચારાથી દૂર રાખો. ૨. મોં, આંખો અને ત્વચાથી દૂર રાખો. ૩. છંટકાવના છાંટાઓને શ્વાસમાં લેવાનું ટાળો. પવનની દિશામાં જ છાંટો. ૪. છંટકાવ પતી ગયા પછી દુષિત કપડાં અને શરીરનાં અંગોને સારી રીતે ધોઈ નાંખો. ૫. છંટકાવ કરતી વખતે કંઈ પણ ખાશો, પીશો, ચાવશો કે ધૂમ્રપાન કરશો નહીં. ૬. કીટકનાશકને ભેળવતી વખતે અથવા છંટકાવ કરતી વખતે વપરાશકર્તાઓએ શરીરને સુરક્ષા આપતાં કપડાં જેવાં કે લાંબી બાંયનું શર્ટ, લાંબુ પેન્ટ, રસાયણ પ્રતિરોધક હાથમોજાં, કાળા ચશ્માં, ટોપી અને બુકાની પહેરવાં.

સાવચેતીરૂપ નિવેદનઃ ૧. પત્રિકા અને પુસ્તિકામાં જણાવેલા પાકોને છોડીને કોઇ અન્ય પાકો પર આનો ઉપયોગ કરવો નહીં. ૨. ઉત્પાદન માછલાં અને અન્ય જળચર જીવો માટે અત્યંત ઝેરી છે, માટે ઉત્પાદનનાં છાંટા માછલાંનો ઉછેર થતો હોય એ જગ્યા પર ઉડવા નહીં જોઈએ

વાપરેલાં પાત્રો, ઉપકરણના ધોવાણ અને વધેલા મટીરિયલનો નિકાલ; ૧. ઉત્પાદકો, કીટકનાશકનું મિશ્રણ બનાવનારાઓ અને વપરાશકર્તાઓની એ ફરજ હશે કે પૅકેજો, વધેલાં મટીરિયલ્સ અને ધોવાણનો નિકાલ એવી સલામત રીતે કરવો કે જેથી પર્યાવરણ અથવા પાણી પ્રદુષિત ના થાય. ૨. વાપરેલાં પૅકેજોનો ફરી વાર ઉપયોગ થતો ટાળવા માટે એને બહાર રઝળતાં ના છોડશો. ૩. પૅકેજોને તોડી નાંખીને એને ઉજ્જડ જગ્યામાં જઈને દાટી દો.

''ખાલી ડબ્બા ફરીથી ઉપયોગ કરવાનું અતરનાક છે.''

ਫ਼ੇਵੇਰੇਟ

ਨੋਵਲੂਰੋਨ ੫.੨੫% + ਇਨਡੋਕਸਾਕਾਰਬ ੪.੫% ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ ਐਸਸੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ।

ਨੋਵਲੂਰੋਨ ੫.੨੫% + ਇਨਡੋਕਸਾਕਾਰਬ ੪.੫% ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ ਐਸਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟਮਾਟਰ ਵਿੱਚ ਹੇਲੀਕੋਵੇਰਪਾ ਅਰਮੀਗੇਰਾ ਅਤੇ ਸਪੋਡੋਪਟੇਰਾ ਲਿਟੁਰਾ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਵਿੱਚ ਸਪੋਡੋਪਟੇਰਾ ਲਿਟੁਰਾ, ਹੇਲੀਕੋਵੇਰਪਾ ਅਰਮੀਗੇਰਾ ਅਤੇ ਸੇਮੀ ਲੂਪਰ, ਅਰਹਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲੀ ਛੇਦਕ ਕੌਂਮਪਲੈਕਸ, ਹੇਲੀਕੋਵੇਰਪਾ ਅਰਮੀਗੇਰਾ, ਮਾਰੂਕਾ ਓਬਟਯੂਜ, ਉੜਦ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲੀ ਛੇਦਕ, ਹੇਲੀਕੋਵੇਰਪਾ ਅਰਮੀਗੇਰਾ, ਐਟਿਏਲਾ ਜਿੰਕਨੇਲਾ ਅਤੇ ਮਾਰੂਕਾ ਵਿਟ੍ਰਾਟਾ, ਮਿਰਚ ਵਿੱਚ ਹੇਲੀਕੋਵੇਰਪਾ ਅਰਮੀਗੇਰਾ, ਪੱਤਾ ਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁੰਡੀ, ਸਪੋਡੋਪਟੇਰਾ ਲਿਟੁਰਾ, ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਾ ਲਪੇਟਕ ਨੈਫੈਲੋਕ੍ਰੋਸਿਸ ਮੇਡਿਨੇਲਿਸ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਿੱਚ ਹੇਲੀਕੋਵੇਰਪਾ ਅਰਮੀਗੇਰਾ ਅਤੇ ਸਪੋਡੋਪਟੇਰਾ ਲਿਟੁਰਾ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਰਸਾਇਨਿਕ ਮਿਸ਼ਰਣ :

ਨੋਵਲੂਰੋਨ ਏ.ਆਈ :	੫.੨੫% ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ
ਇਨਡੋਕਸਾਕਾਰਬ ਏ.ਆਈ :	੪.੫੦% ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ
ਡੀਮਿਥਾਇਲ ਸਲਫੋਕਸਾਇਡ :	੭.੮੦% ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ
ਪੋਲੀਏਥੇਲੀਨ ਗ਼ਲਾਇਕੋਲ :	੭.੨੦% ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ
ਪ੍ਰੋਪਾਇਲੇਨ ਗਲਾਇਕੋਲ:	੨.੦੦% ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ
ਜ਼ੈਂਨਥੇਨ ਗੱਮ:	੯.੭੦% ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ
੧,੨ ਬੈਂਜਿਸੋਥਿਆਜ਼ੋਲਾਈਨ-੩-ਇੱਕ:	੦.੦੫% ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ
ਸਾੱਫਟ ਪਾਣੀ:	ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ
ਕੁਲ:	**੧੦੦.੦੦% ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ**

ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ :

ਫ਼ਸਲ (ਲਾਂ)	ਕੀਟ ਦਾ ਆਮ ਨਾਮ	ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਤਿ ਹੈਕਟੇਅਰ		ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਲੀ.)	ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸਪ੍ਰੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਡੀਕ ਅਵਧੀ (ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ)
		ਏ.ਆਈ. ਗ੍ਰਾ.	ਸੂਤਰੀਕਰਣ (ਮਿ.ਲੀ.)		
ਟਮਾਟਰ	ਫ਼ਲ ਛੇਦਕ (ਹੇਲੀਕੋਵੇਰਪਾ ਅਰਮੀਗੇਰਾ) ਅਤੇ ਪੱਤਾ ਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁੰਡੀ (ਸਪੋਡੋਪਟੇਰਾ ਲਿਟੁਰਾ)	੪੩.੩੧ + ੩੭.੧੩- ੪੫.੯੪ + ੩੯.੩੮	੮੨੫ - ੮੭੫	੫੦੦	੫
ਸੋਇਆਬੀਨ	ਸਪੋਡੋਪਟੇਰਾ ਲਿਟੁਰਾ, ਹੇਲੀਕੋਵੇਰਪਾ ਅਰਮੀਗੇਰਾ ਅਤੇ ਸੇਮੀ ਲੂਪਰ	੪੩.੩੧ + ੩੭.੧੩- ੪੫.੯੪ + ੩੯.੩੮	੮੨੫ - ੮੭੫	੫੦੦	੧੪
ਅਰਹਰ	ਫ਼ਲੀ ਛੇਦਕ ਕੌਂਮਪਲੈਕਸ (ਹੇਲੀਕੋਵੇਰਪਾ ਅਰਮੀਗੇਰਾ, ਮਾਰੂਕਾ ਓਬਟਯੂਜ)	੪੩.੩੧ + ੩੭.੧੩- ੪੫.੯੪ + ੩੯.੩੮	੮੨੫ - ੮੭੫	੫੦੦	੨੫
ਉੜਦ	ਉੜਦ ਦਾ ਫ਼ਲੀ ਛੇਦਕ ਕੌਂਮਪਲੈਕਸ (ਐਟਿਏਲਾ ਜਿੰਕਨੇਲਾ ਅਤੇ ਮਾਰੂਕਾ ਵਿਟ੍ਰਾਟਾ)	੪੩.੩੧ + ੩੭.੧੩- ੪੫.੯੪ + ੩੯.੩੮	੮੨੫ - ੮੭੫	੫੦੦	੧੪
ਮਿਰਚ	ਫ਼ਲ ਛੇਦਕ ਕੌਂਮਪਲੈਕਸ (ਹੇਲੀਕੋਵੇਰਪਾ ਅਰਮੀਗੇਰਾ, ਸਪੋਡੋਪਟੇਰਾ ਲਿਟੁਰਾ)	੪੩.੩੧ + ੩੭.੧੩- ੪੫.੯੪ + ੩੯.੩੮	੮੨੫ - ੮੭੫	੫੦੦	੭
ਝੋਨਾ	ਪੱਤਾ ਲਪੇਟਕ (ਨੈਫੈਲੋਕ੍ਰੋਸਿਸ ਮੇਡਿਨੇਲਿਸ)	੨੨.੯੭+ ੧੯.੬੯	੪੩੭.੫	੫੦੦	੪੦
ਮੂੰਗਫਲੀ	ਹੇਲੀਕੋਵੇਰਪਾ ਅਰਮੀਗੇਰਾ ਅਤੇ ਸਪੋਡੋਪਟੇਰਾ ਲਿਟੁਰਾ	੪੫.੯੪ + ੩੯.੩੮	੮੭੫	੫੦੦	੩੪

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੰਗੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ :

ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ : ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾਓ। ਇੱਕ ਛੜੀ ਜਾਂ ਸੋਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਓ ਅਤੇ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਮਾਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, ਅੰਤਮ ਸਪਰੇਅ ਸਾੱਲਯੂਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ।

ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ : (ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ) : ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ (ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) : ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਿੱਟੀ। ਛਿੜਕਾਅ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਵੇਦਨ ਲਈ ਫਸਲ ਪੜਾਅ :

ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਤਕਨਿਕ : ਫੋਲਿਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

ਉਪਕਰਣ ਪ੍ਰਕਾਰ : ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਫੁੱਟ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਕੰਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਜਾਂ ਮੋਟਰਰਾਇਜ਼ਡ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਵਾੱਲਯੂਮ ਨੋਜ਼ਲ ਲਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਨੋਜ਼ਲ ਪ੍ਰਕਾਰ : ਹਾਈ ਵਾੱਲਯੂਮ ਨੋਜ਼ਲ

ਖੁਰਾਕ : ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ

ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ : ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾਓ। ਇੱਕ ਛੜੀ ਜਾਂ ਸੋਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਓ ਅਤੇ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਮਾਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, ਅੰਤਮ ਸਪਰੇਅ ਸਾੱਲਯੂਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ।

ਪੁਨਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ : ੪੮ ਘੰਟੇ

ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ : ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ

ਆਵੇਦਨ ਦਾ ਸਮਾਂ : ਛਿੜਕਾਅ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੀਟ ਆਬਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੀਮਾ ਪੱਧਰ (ਈਟੀਐਲ) ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ :

ਅਵਸਥਾ ਜਿਸਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ :

ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਵੇਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ :

ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਅਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ : ਜੇਕਰ ਧੂੰਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਖੰਘ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ, ਰਸਾਇਣਕ ਨਿਮੋਨਾਇਟਿਸ, ਫ਼ੇਫੜੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਬ੍ਰੋਨਕੋਸਪੈਸਮ। ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਲਟੀਆਂ, ਮਤਲੀ, ਦਸਤ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਤ੍ਵਚਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਣ ਨਾਲ ਲਾਲੀ, ਐਡੀਮਾ ਜਾਂ ਡਰਮੇਟਾਇਟਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੰਝੂ, ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਲਟ ਅਨਿਮੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਉਪਚਾਰ ਮਾਪਦੰਡ : ਨਿਗਲ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ : ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਤੇ, ਮੂੰਹ ਧੁਆਓ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ੧ ਜਾਂ ੨ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਪਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਲਟੀ ਨਾ ਕਰਵਾਓ। ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੇ : ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਬਣਾਵਟੀ ਸਾਹ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਤੇ : ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਹੁੰਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਸਮੇਤ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਦਿਓ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਦਰਦ, ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਜਲਨ ਰਹੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਾਓ। ਸਾਰੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਕਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਧੋ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਤੇ : ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੂਬ ਸਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ੧੫ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਕੋਮਲਤਾ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਦਰਦ, ਜਲਨ, ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਵਿਸ਼ਨਿਵਾਰਕ : ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ਨਿਵਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਸਹਾਇਕ ਉਪਚਾਰ ਦਿਓ।

ਪੌਦ ਵਿਸ਼ਾਕਤਤਾ : ਜਦੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਵਿਸ਼ੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭੰਡਾਰਣ ਸਥਿਤੀਆਂ : ੧. ਜਿਹੜੇ ਡਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭੋਜਨ ਸਾਮਗ੍ਰੀ, ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਪਰਿਸਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਵਰੂਪ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਗ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜੰਦਰਾ ਚਾਬੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ੨. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਪਰਿਸਰ, ਸੁੱਕੇ, ਠੰਡੇ ਰੋਸ਼ਨੀਦਾਰ, ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਸਾਇਜ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂਕਿ ਭਾਫ਼ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕੇ।

ਉਪਭੋਕਤਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ : ੧. ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਖੋ। ੨. ਮੂੰਹ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ। ੩. ਸਪ੍ਰੇ ਦਾ ਧੂੰਆ ਸਾਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਵੇ. ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਪ੍ਰੇ ਕਰੋ। ੪. ਸਪ੍ਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਦੇ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਧੋ ਲਵੋ। ੫. ਸਪ੍ਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਣ ਸਿਗਰੇਟ, ਪੀਣਾ, ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚਬਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ੬. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਮਿਲਾਨ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਭੋਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਬਾਂਹਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਟ, ਲੰਬੀ ਪੈਂਟ, ਰਸਾਇਨਿਕ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧੀ ਦਸਤਾਨੇ, ਜੂਤੇ, ਚਸ਼ਮਾ, ਟੋਪੀ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਵਰਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਪੜੇ ਪਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਾਵਧਾਨੀ ਬਿਆਨ : ੧. ਇਸ ਲੇਬਲ / ਲੀਫ਼ਲੈਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ੨. ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ। ਇਸ ਲਈ, ਐਕ੍ਵਾਕਲਚਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੱਬੇ, ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਧੋਣ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ : ੧. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤੇ ਗਏ ਡੱਬੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਵਿਭਿੰਨ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਧੋਣ ਅਤੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ੨. ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਛੱਡੋ ਤਾਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ੩. ਡੱਬੇ ਤੋੜ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਕੇ ਦਬਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

''ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।''

DIRECTION FOR USE

Read Leaflet Before Use

इस्तेमाल से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें।

FOR AGRICULTURAL USE

कृषि उपयोग के लिए

FAVORATE

Novaluron 5.25% + Indoxacarb 4.5% w/w SC (Insecticide)



फेवरेट

नोवाल्यूरॉन ५.२५% + इंडोक्साकार्ब ४.५% एस. सी. (कीटनाशक)

Marketed by:

GUJARAT INSECTICIDES LIMITED

Plot No.805/806,GIDC Estate, Ankleshwar Dist. Bharuch, Gujarat - 393002.

विक्रेता:**गुजरात इन्सेक्टीसाईडस् लिमिटेड,**

प्लॉट नं.:८०५/८०६, जी.आई.डी.सी.एस्टेट अंकलेश्वर, जिला- भरूच,गुजरात-३९३००२

Manufactured by:

GHARDA CHEMICALS LIMITED,

Regd.Office:Gharda House,48,Hill Road,Bandra (W),Mumbai-400050.

Factory:Industrial Growth Centre,Phase II, Samba Dist.Samba,Pin 184121,Jammu&Kashmir.


निर्माता: **घरडा केमिकल्स लिमिटेड,**

पंजी. कार्यालय: घरडा हाउस, ४८ हिल रोड बांद्रा (प), मुंबई - ४०० ०५०. फॅक्टरी: इन्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेन्टर, फेज २, साम्बा, जम्मू-कश्मिर - १८४१२१.

For any complaints contact Customer care Executive at Gujarat Insecticides Limited,Plot No. 805/806,GIDC Estate,Ankleshwar,Dist.Bharuch,Gujarat-393002.**Tel.:02646 668200**

Email:customercare@gilgharda.com

website: www.gilgharda.com



J.07.26-01

570mm (L) X 350 mm (H)

Bengali | Telugu | Tamil | Kannada | Oriya | Urdu

ফেভোরেট

নোভালুরন ৫.২৫% + ইণ্ডক্সাকার্ব ৪.৫% ওজন/ওজন এসসি
কীটনাশক

ব্যবহারের পূর্বে লিফলেট পড়ে নিন।

নোভালুরন ৫.২৫% + ইণ্ডক্সাকার্ব ৪.৫% ওজন/ওজন এসসি টমেটো চাষে হেলিকোভের্পা আর্মিগেরা এবং স্পডপ্টেরা লিটুরা নিয়ন্ত্রণের জন্যে, সোয়াবিন চাষে স্পডপ্টেরা লিটুরা, হেলিকোভের্পা আর্মিগেরা এবং ঘোড়া পোকা নিয়ন্ত্রণ করতে, অড়হড় চাষে মিশ্র শুঁটিছিদ্রক পোকা, হেলিকোভের্পা আর্মিগেরা, মারুকা অবট্যুজ নিয়ন্ত্রণ করতে, কলাই চাষে কলাইয়ের মিশ্র শুঁটিছিদ্রক পোকা, এটিলা জিঙ্কেনিলা, মারুকা ভিট্রাটা নিয়ন্ত্রণ করতে, লঙ্কা চাষে হেলিকোভের্পা আর্মিগেরা, পাতাখেকো শুঁয়াপোকা, স্পডপ্টেরা লিটুরা নিয়ন্ত্রণ করতে, ধান চাষে পাতামোড়া পোকা সিনাফালোক্রোসিস মেডিনালিস নিয়ন্ত্রণ করতে, চিনেবাদাম চাষে হেলিকোভের্পা আর্মিগেরা এবং স্পডপ্টেরা লিটুরা নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহৃত হয়।

রাসায়নিক সংমিশ্রণ :

নোভালুরন সঃ উঃ ৫.২৫% ওজন/ওজন

"খালি পাত্র ব্যবহার করা বিপজ্জনক"

ఫేవరెట్

నోవాలురాన్ 5.25% + ఇండోక్సాకార్బ్ 4.5% బ/బ ఎస్‌సి
కీటకనాశిని

ఉపయోగించడానికి ముందు కరపత్రం చదవండి.

నోవాలురాన్ 5.25% + ఇండోక్సాకార్బ్ 4.5% బ/బ ఎస్‌సిని టమాటా పంటలో హెలికోవెర్పా ఆర్మిజెరా మరియు స్పోడోప్టెరా లిటురా, సోయాబీన్‌లో స్పోడోప్టెరా లిటురా, హెలికోవెర్పా ఆర్మిజెరా మరియు సెమీ లూపర్, కందిలో మిశ్రమ కాయతొలుచు పురుగులైన హెలికోవెర్పా ఆర్మిజెరా, మారుకా అబ్‌ట్యూస్, మినుము పంటలో మిశ్రమ మినుము కాయ తొలుచు పురుగులు హెలికోవెర్పా ఆర్మిజెరా, ఎటియెల్లా జింకెనెల్లా, మారుకా విట్రాటా, మిరప పంటలో హెలికోవెర్పా ఆర్మిజెరా, ఆకు తిను గొంగళిపురుగు, స్పోడోప్టెరా లిటురా, వరి పంటలో ఆకు ముడత, సినాఫాలోక్రోసిస్ మెడినాలిస్, వేరుశనగ పంటలో హెలికోవెర్పా ఆర్మిజెరా మరియు స్పోడోప్టెరా లిటురాను నియంత్రించేందుకు ఉపయోగించాలి.

రసాయనికమిశ్రమం:

"ఖాళీ డబ్బాలని తిరిగి ఉపయోగించడం ప్రమాదం"

ஃபேவொரேட்

நோவாலுரோன் 5.25% + இண்டோக்ஸாகர்ப் 4.5% எ/எ எஸ்சி
பூச்சிக்கொல்லி

உபயோகிப்பதற்கு ன்பு சிற்றேட்டை படிக்கவும்.

நோவாலுரோன் 5.25% + இண்டோக்ஸாகர்ப் 4.5% எ/எ எஸ்சி பூச்சிக்கொல்லி மருந்தை தக்காளி பயிரில் ஹெலிகோவெர்ப அர்மிகெரா மற்றும் புரோடீனியா புழு; சோயாபீன் பயிரில் ஸ்பொடோப்டிரா லிடுரா, ஹெலிகோவெர்பா அர்மிகெரா, ஹெலிகோவெர்பா அர்மிகெரா மற்றும் அரைக்காவடிப் புழு, துவரை பயிரில் காய் துளைப்பான் வகை புழுக்கள், ஹெகிகோவெர்பா அர்மிகெரா, மருகா அப்டுஸ்,; உளுந்து பயிரில் காய் துளைப்பான் வகை புழுக்கள், ஹெலிகோவெர்பா அர்மிகெரா, இடியெல்க்லா ஜின்கினெல்லா, மருகோ விட்ரடா; மிளகாய் பயிரில் ஹெலிகோவெர்பா அர்மிகெரா, இலை தின்னும் பூச்சி, ஸ்போடோப்டிரா லிடுரா; நெற்பயிரில் இலை மடிப்பான், சினபலோக்ரோசிஸ் மெடினலிஸ்; நிலக்கடலை பயிரில் ஹெலிகோவெர்பா அர்மிகெரா மற்றும் ஸ்போடோப்டிரா லிடுரா பூச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்த சிறப்பாகப் பயன்படும்.

இரசாயனச் சேர்க்கை:

"வெற்று கொள்கலனை பயன்படுத்துவது அபாயகரமானது"

ಫೇವೊರೇಟ್

ನೊವಾಲುರಾನ್ 5.25% + ಇಂಡೊಕ್ಸಾಕಾರ್ಬ್ 4.5 % ತೂ/ತೂ ಎಸ್ ಸಿ
ಕೀಟನಾಶಕ

ಬಳಸುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿರಿ.

ನೊವಾಲುರಾನ್ 5.25% + ಇಂಡೊಕ್ಸಾಕಾರ್ಬ್ 4.5 % ತೂ/ತೂ ಎಸ್ ಸಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹೆಲಿಕೋವರ್ಪಾ ಆರ್ಮಿಜಿರಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪೊಡೋಪ್ತೆರಾ ಲಿಟುರಾ , ಎಲೆಕೋಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸ್ಪೊಡೋಪ್ತೆರಾ ಲಿಟುರಾ, ಹೆಲಿಕೋವರ್ಪಾ ಆರ್ಮಿಜಿರಾ ಮತ್ತು ಸೆಮಿಲೂಫರ್, ಬಟಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಬೀಜಕೊರೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ಹೆಲಿಕೋವರ್ಪಾಆರ್ಮಿಜಿರಾ, ಮಾರುಕಾ ಒಬ್ಟೂಸ್, ಉದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಉದ್ದುಬೀಜಕೊರೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ಹೆಲಿಕೋವರ್ಪಾ ಆರ್ಮಿಜಿರಾ , ಎಟಿಯೆಲ್ಲಾ ಜಿಂಕಿನೆಲ್ಲಾ, ಮರುಕಾ ವಿಟ್ರಾಟಾ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹೆಲಿಕೋವರ್ಪಾ ಆರ್ಮಿಜಿರಾ, ಎಲೆತಿನ್ನುವ ಮಿಡತೆ, ಸ್ಪೋಡೋಪ್ತೆರಾ ಲಿಟುರಾ, ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಲೀಫ್ ಫೊಲ್ಡರ್ , ಕೆನೊಫಲೊಕ್ರೊಸಿಸ್ ಮೆಡಿನಲಿಸ್, ಶೇಂಗಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹೆಲಿಕೋವರ್ಪಾ ಆರ್ಮಿಜಿರಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪೊಡೊಪ್ತೆರಾ ಲಿಟುರಾ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಘಟಕಾಂಶಗಳು :

"ಬರಿದಾದ ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ."

ଫେଭୋରେଟ୍

ନୋଭାଲୁରୋନ୍ ୫.୨୫% + ଇଣ୍ଡୋକ୍ସାକାର୍ବ ୪.୫% ଡବ୍ଲୁ/ଡବ୍ଲୁ ଏସସି
କୀଟନାଶକ

ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲିଫଲେଟକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ

ନୋଭାଲୁରନ୍ ୫.୨୫% ଇଣ୍ଡୋକ୍ସାକାର୍ବ ୪.୫% ଡବ୍ଲୁ/ଡବ୍ଲୁ ଏସସିକୁ ଟମାଟୋରେ ହେଲିକୋଭେର୍ପା ଆର୍ମିଜେରା ଓ ସ୍ପୋଡୋପେଟ୍ରା ଲିଟୁରାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସୋୟାବିନରେ ସ୍ପୋଡୋପେଟ୍ରା ଲିଟୁରା, ହେଲିକୋଭେର୍ପା ଆର୍ମିଜେରା ଓ ସେମି ଲୁପରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ହରଡ଼ରେ ପଡ୍ ବୋରର୍ କମ୍ପଲେକ୍ସ ହେଲିକୋଭେର୍ପା ଆର୍ମିଜେରା, ମାରୁକା ଅବ୍‌ଟ୍ୟୁସର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ବିରିରେ ବ୍ଲାକ୍ ଗ୍ରାମ ପଡ୍ ବୋରର୍ କମ୍ପଲେକ୍ସ, ହେଲିକୋଭେର୍ପା ଆର୍ମିଜେରା, ଏଟିଏଲା ଜିଙ୍କେନେଲା, ମାରୁକା ଭିଉଟାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଲଙ୍କାରେ ହେଲିକୋଭେର୍ପା ଆର୍ମିଜେରା, ପତ୍ର ଖାଉଥିବା କାଟରପିଲର, ସ୍ପୋଡୋପେଟ୍ରା ଲିଟୁରାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଧାନରେ ପତ୍ର ମୋଡ଼କ କାଫାଲୋକ୍ରୋସିସ୍ ମେଡିନାଲିସର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଚିନାବାଦାମରେ ହେଲିକୋଭେର୍ପା ଆର୍ମିଜେରା ଓ ସ୍ପୋଡୋପେଟ୍ରା ଲିଟୁରାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।

ରସାୟନିକ ସଂରଚନା

"ଖାଲି କଣ୍ଟେନର ବ୍ୟବହାର କରିବାର ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ"

فیوریٹ

نووالورون ۵٫۲۵٪ + انڈوکساکارب ۴٫۵٪ ڈبلیو / ڈبلیو ایس سی
کیڑے مار

استعمال سے پہلے پرچہ پڑھ لیں۔

نووالورون ۵٫۲۵٪ + انڈوکساکارب ۴٫۵٪ ڈبلیو / ڈبلیو ایس سی کا استعمال ٹماٹر میں ہیلیکوویرپا ارمیجیرا اور اسپوڈوپٹیرا لیٹورا کو قابو کرنے کیلئے، صویابین میں اسپوڈوپٹیرا لیٹورا، ہیلیکوویرپا ارمیجیرا، سیمی لوپر کو قابو کرنے کیلئے، ارہر میں پوڈ بورر کامپلیکس ہیلیکوویرپا ارمیجیرا، ماروکا اوبٹیوس کو قابو کرنے کیلئے، کالے چنے میں کالے چنے میں پوڈ بورر کامپلیکس ہیلیکوویرپا ارمیجیرا، ایٹیلا زنکینیلا، ماروکا ویٹراٹا کو قابو کرنے کیلئے، مرچی میں ہیلیکوویرپا ارمیجیرا، پتّے کھانے والے کیٹرپلّر، اسپووڈوپٹیرا لیٹورا کو قابو کرنے کیلئے، چاول میں لیف فولڈر نیفیلوکروسیس میڈینالیس کو قابو کرنے کیلئے، مونگ پھلی میں ہیلیکوویرپا ارمیجیرا اور اسپووڈوپٹیرا لیٹورا کو قابو کرنے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے۔

کیمیائی اجزائے ترکیبی :

نووالورون اے. آئی. ۵٫۲۵٪ ڈبلیو / ڈبلیو

انڈوکساکارب اے. آئی. ۴٫۵۰٪ ڈبلیو / ڈبلیو

خالی کنٹینر کو دوبارہ استعمال کرنا خطرناک ہے۔

570mm (L) X 350 mm (H)