Garaj

Fipronil 0.6% w/w GR

(Insecticide)

Read Leaflet Before Use.

Fipronil 0.6% w/w GR formulation contains 6g of Fipronil active ingredient per kg of formulation Fipronil 0.6% w/w GR formulation is used as a foliar spray for the control of Stem borer and leaf folder in Rice.

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA A.I. (gm)	Dosage/HA Formulation (kg)	Dilution in Water	Waiting Period between last spray to harvest (days)	Re-entry after each Application (In Hours)
Rice	Stem borer Leaf folder	60	10	-	65	-

Caution: Not to be used on crops other than those prescribed on label and leaflets. Destroy the container after use as directed on leaflet.

Direction of Use:

Time of Application: Fipronil 0.6% w/w GR is recommended for application along with sand (@ 50 kg sand/ha) at the time of initial infestation of the insect pest. Method of application: Recommended dosage for granule should be broadcasted as sand mix using hand operated granule applicator or mechanical dispenser. Standing water of 2-3 cm depth should be available in the field keep water impounded for 2-3 days after application.

Precaution: Handle with care. While handling the product, wear personal protective clothing, rubber gloves, rubber boot, safety glasses and face mask. Avoid contact with eyes and skin. After each spraying wash hands and exposed parts of the body thoroughly. Avoid drinking, eating or smoking during spraying.

Symptoms Of Poisoning: In severe intoxication cases nausea, vomiting profuse sweating and agitation may be observed.

First Aid: Ingestion - Do not induce vomiting unless advised by the attending physician. If patient is alert and conscious rinse the mouth with water Give 1 -2 glass of water. Inhalation - keep the patient away from the place of incident loosen the clothes. If patient is not breathing give mouth to mouth breathing or artificial respiration. Eye - wash with plenty of water of normal temperature at least for 15 minutes. If redness pain and irritation occur. Call the eye specialist immediately. Skin - wash thoroughly, with plenty of water. If symptoms of irritation and blistering occur, call the skin specialist immediately.

Phototoxicity:

Antidote: No specific antidote is known. Give symptomatic treatment.

Disposal Of Used Container: 1. The empty container shall be broken and buried away from the habitation or incinerated. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re use. 3. Packages or surplus material and washings should be disposed off in safe manner so as to prevent environment and water pollution.

Storage Conditions: 1. The packages containing insecticides shall be stores in separate room or premises, away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate rooms/almirahs under lock and key depending upon the nature and quantity of the insecticide. 2. The rooms or premises meant for storing insecticides shall be well-built, well lit, dry well ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapor/air.

Chemical Composition:	
Fipronil (a.i)	0.600 % w/w
Diacetone alcohol (Solvent)	2.500 % w/w
Diatomaceous earth (Filler)	1.000 % w/w
Tristyryl phenol ethoxylate (Emulsifier)	0.150 % w/w
Erythrosin (Dye)	0.025 % w/w
Sand (carrier)	Q.S. %
Total	**100.000 % w/w**

" DANGEROUS TO RE USE EMPTY CONTAINER "

गरज

फिप्रोनिल ०.६ प्रतिशत भा/भा जी. आर.

(कीटनाशक)

उपयोग से पहले लीफलेट पढ़ें।

फिप्रोनिल ०.६ प्रतिशत भा/भा जी. आर. में ६ ग्राम फिप्रोनिल सक्रिय तत्व प्रति किलो फारमुलेशन में समाविष्ट है। फिप्रोनिल ०.६ प्रतिशत भा/भा जी. आर. धान पर आने वाले तना छेदक और पता लपेट सुंडी की रोकथाम के लिए सिफारिश किया जाता है।

उपयोग:

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स. तत्व ग्राम	संरचना कि. ग्राम	पानी की मात्रा	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिनों में)	पुन: प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
धान	तना छेदक पत्ता लपेट सुंडी	६०	१०	–	६५	–

चेतावनीः इस लेबल/लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। पत्रक पर दिए निर्देश अनुसार उपयोग के बाद खाली डिब्बों को नष्ट करें।

उपयोग के लिए निर्देश:

प्रयोग का समय: कीटनाशक का प्रयोग वालू के साथ मिलाकर कीटों के प्रथम लक्षण दिखने पर तुरन्त करें। प्रयोग की विधी और उपयोग के लिए सामग्री: सिफारिश की गयी कीटनाशक की मात्रा को वालू के साथ मिलाकर हाथों से चलाने वाले दानेदार एप्लीकेटर या डिस्पेंसर से बिखेरना चाहिए धान के फसलों में इसका प्रयोग करते समय २-३ सेन्टीमीटर पानी खडा रहने दीजिये। पानी को २ से ३ दिन तक रहने दीजिए।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां: कीटनाशक को रखने में सावधानी बरते। इसका प्रयोग करते समय सुरक्षाकारी कपड़े डाले रबड़ के दस्ताने, रबड़ के जूते, सुरक्षा ऐनक एवं मुखौटा पहने। त्वचा और ऑखों से सम्पर्क से बचे। कीटनाशक के प्रयोग के बाद हाथों और त्वचा के दूषित भागों को अच्छी तरह साबुन से धोए। छिड़काव के समय खाना पीना या धुम्रपान न करे।

विष के लक्षण: अधिक मात्रा में विषबाधा होने पर उल्टी, पसीना आना, सुस्ती आना, घबराहट होना, यह विषबाधा के लक्षण है।

प्राथमिक चिकित्सा: निगले जाने पर डाक्टरी सलाह के बिना उल्टी न कराये। अगर मरीज होश में हो तो उसका मुंह पानी से धोए और उसे १-२ गिलास पानी पिलाए। श्वास द्वारा अंदर जाने पर मरीज को दूषित जगह से दूर ले जाए। कपड़ो को ढिला करें अगर मरीज की सांस रूक जाए तो कृत्रिम श्वसन दे। ऑखों में जाने पर, ऑखे साधारण ठण्डे पानी से १५ मिनिट तक धोए। ऑखे लाल हो या जलन हो तो तुरन्त डॉक्टर को बुलाऍ। त्वचा के साथ सम्पर्क होने त्वचा को भरपूर पानी से धोले। त्वचा पर जलन या छाले पडे तो तुरन्त त्वचा विशेषज्ञ को बुलाऍ।

पौधविशाक्तता:

विष नाशक: कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा: १. खाली डिब्बों को जानवरों तथा इन्सान के रहने वाली जगह से दूर नष्ट करें तथा जमीन में गाड दीजिए या इनसिनरेटर में जला दे। २. खाली डिब्बों को बाहर न रखिए ताकि दुबारा इस्तेमाल न हो सके। ३. डिब्बों, बचे हुए फफूंदीनाशक तथा धोवन को सावधानी से एक तरफ फैंके ताकि वातावरण या पानी दूषित न हो।

संग्रहण की शर्तें: १. कीटनाशक के डिब्बों को अलग कमरों या भवन में रखे व अन्य पदार्थों के संग्रह हेतु कमरों या भवन से दूर रखना चाहिए अथवा कीटनाशक के प्रकार और मात्रा के आधार पर अलग अलमारी में ताला लगाकर रखना चाहिए। २. कीटनाशकों के भण्डारण हेतु बने कमरें या परिसर अच्छी तरह बने हुए अच्छी रोशनीदार, सूखे पर्याप्त हवादार एवं बड़े होने चाहिए ताकि वाष्प/हवा के साथ प्रदुषण की स्थिती उत्पन न बने।

रासायनिक संरचना:	
फिप्रोनिल सक्रिय तत्व	०.६००% भा/भा
डायऑसीटोन अलकोहल (साल्वेंट)	२.५००% भा/भा
डायऑटोमेसीयम अर्थ (फिलर)	१.०००% भा/भा
ट्राइस्टाराइल फिनॉल इथाक्सीलेट (इमल्सीफायर)	०.१५०% भा/भा
ऐरोथ्रोसीन (डाई)	०.०२५% भा/भा
सैंड (कैरीयर)	शेष %
योग:	१००.०००% भा/भा

" खाली कंटेनर का दोबारा उपयोग करना खतरनाक है। "

गरज

फिप्रोनिल ०.६% व/व जी. आर

(कीटकनाशक)

उपयोग करण्यापूर्वी माहितीपत्रक वाचा.

फिप्रोनिल ०.६% व/व जी. आर. मधे ६ ग्राम फिप्रोनिल सक्रिय घटक प्रति किलो फॉरम्युलेशन मध्ये समाविष्ट आहे. फिप्रोनिल ०.६% व/व जी. आर चा वापर भातावरील खोड किड व पाने गुंडाळणारी अळीच्या नियंत्रणासाठी केला जातो.

शिफारस:

पीक	कीटकाचे सामान्य नाव	प्रति हेक्टर मात्रा सक्रिय घटक (ग्रा.)	फॉर्म्युलेशन (कि. ग्रा.)	पाण्यात सौम्य करणे	शेवटची फवारणी आणि पीक यातील वाट पाहण्याचा कालावधी	प्रत्येक फवारणीनंतर पुन: प्रवेशाचा कालावधी (तास)
भात	खोड किड पाने गुंडाळणारी अळी	६०	१०	–	६५	–

खबरदारी : लेबल व पत्रकांवर लिहून दिलेल्या पिकांखेरीज इतर पिकांवर वापरू नये. पत्रकावर सांगितल्याप्रमाणे वापरल्यानंतर कंटेनर नष्ट करा.

वापरासाठी निर्देश:

वापरण्याची वेळ: फिप्रोनिल ०.६% व/व जी. आर. चा वापर वाळू बरोबर (५०किलो वाळू प्रति हेक्टर) मिसळून कीटकांची प्रथम लक्षणे दिसल्यावर लगेच करा. वापरण्याची पद्धत आणि वापरासाठी सामग्री: शिफारस केलेली कीटकनाशकाची मात्रा वाळू बरोबर मिसळून हाताने चालणारे दानेदार एप्लीकेटर वा डिस्पेंसरने पसरविले पाहिजे. भात शेतात याचा वापर करते वेळी २-३ सेंटीमीटर पाणी उभं राहू द्या. वापरानंतर पाणी २-३ दिवस तसचं राहू द्या.

वापरकर्त्यांसाठी सावधगिरी: कीटकनाशक हाताळताना सावधानी बाळगा. याचा वापर करतेवेळी संरक्षित कपडे घाला. रबरी हातमोजे, रबरी बूट, सुरक्षा चष्मा तसेच मुखवटा घाला. त्वचा व डोळ्यांशी संपर्क टाळा. कीटकनाशकाच्या प्रत्येक फवारणीनंतर हात व शरीराचा दूषित भाग संपूर्णपणे धुवा. फवारणी करते वेळी खानपान वा धुम्रपान करू नका.

विषबाधेची लक्षणे: जास्त प्रमाणात विषबाधा झाल्यास उल्टी, घाम येणे, आळस येणे, घाबरल्यासारखे होणे इ. विषबाधेची लक्षणे दिसून येतात.

प्राथमिक उपचार: गिळले गेल्यास – डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय उल्टी करू नका. जर रोगी शुद्धीत असेल तर त्याचे तोंड पाण्याने धुवा आणि त्याला १-२ ग्लास पाणी पाजा. श्वासावाटे आत गेल्यास – रोग्यास दूषित जागेपासून दूर घेऊन जा. कपडे सैल करा. जर रोगी श्वास घेत नसेल तर कृत्रिम श्वास द्या. डोळ्यात गेल्यास – डोळे साध्या थंड पाण्याने १५ मिनिटापर्यंत धुवा. डोळे लाल झाले असतील वा जळजळ होत असेल तर ताबडतोब डोळ्यांच्या डॉक्टरांना बोलवा. त्वचेशी संपर्क झाल्यास – त्वचा भरपूर पाण्याने धुवा. त्वचा भाजली असेल वा भेगा पडल्या असतील तर त्वचेच्या डॉक्टरांना बोलवा.

रोपविषाक्तता:

विषोपचार: कोणताही खास उपचार ज्ञात नाही. लक्षणानुसार उपचार करावेत.

वापरलेल्या डब्यांची विल्हेवाट: १. रिकामे डबे मोडून-तोडून वस्तीपासून दूर सुरक्षित ठिकाणी पुरून टाकावेत. २. वापरलेले रिकामे डबे अथवा पॅकेजिसचा पुनः वापर टाळण्यासाठी उघड्यावर टाकू नयेत. ३. पाण्याचे किंवा पर्यावरणाचे प्रदुषण टाळण्यासाठी रिकामी पॅकेजेस, उरलेले मिश्रण आणि धुवणाचे पाणी यांची सुरक्षितरित्या विल्हेवाट लावावी.

साठवणीच्या अटी: १. हे कीटकनाशक असणारी पॅकेजिस इतर माल ठेवण्यासाठी असलेल्या जागा व खोल्या यापासून, विशेषतः अन्नपदार्थ ठेवण्यासाठी असलेल्या जागा व खोल्या यापासून दूर जागी वा खोल्यात किंवा कीटकनाशकचे प्रमाण व स्वरूप यांचा विचार करून स्वतंत्र कपाटात कडीकुलपात ठेवावीत. २. कीटकनाशकची साठवण करावयाच्या खोल्या पक्क्या बांधणीच्या भरपूर उजेडाच्या, हवेशीर, कोरड्या व पुरेशा मोठ्या असाव्यात म्हणजे वाफेने होणारे प्रदुषण टळेल.

रासायनिक संरचना:	
फिप्रोनिल सक्रिय तत्व	०.६००% व/व
डायऑसीटोन अलकोहल (साल्वेंट)	२.५००% व/व
डायऑटोमेसीयम अर्थ (फिलर)	१.०००% व/व
ट्राइस्टाराइल फिनॉल इथाक्सीलेट (इमल्सीफायर)	०.१५०% व/व
ऐरोथ्रोसीन (डाई)	०.०२५% व/व
वाळू (कॅरीयर)	पुरेशी मात्रा %
एकूण:	१००.०००% व/व

" रिकामे कंटेनर पुन्हा वापरणे धोकादायक आहे."

ગરજ

ફિપ્રોનિલ 0.6% w/w જીઆર

(કીટકનાશક)

વપરાશ પહેલાં પરિપત્ર વાંચો.

ફિપ્રોનિલ 0.6% વ/વ જીઆર ફૉર્મ્યુલેશન જેમાં છે પ્રતિ કિલો દ્રાવણમાં 6 ગ્રામ ફિપ્રોનિલ સ.ત. ફિપ્રોનિલ 0.6% વ/વ જીઆર સંરચનાનો ઉપયોગ ડાંગરના પાકમાં લાગતી ડૂખ છેદક અને પાન વળનારી ઇયળના નિયંત્રણ માટે પાંદડાં પરના છંટકાવ તરીકે કરવામાં આવે છે.

ભલામણો:

પાક(કો)	કીટકનું સામાન્ય નામ	માત્રા/હેક્ટર સ.ત. (ગ્રામ)	સંરચના (કિલો)	પાણીમાં મંદતા	અંતિમ છંટકાવ પછી લણણી વચ્ચેના પ્રતિક્ષાગાળા (દિવસો)	પ્રત્યેક પુનઃ પ્રવેશની અવધિ (કલાકો)
ડાંગર	ડૂખ છેદક પાન વળનારી ઇયળ	60	10	-	65	-

સાવધાની: લેબલ અને પત્રિકાઓ પર સૂચવવામાં આવેલ સિવાયના પાકો પર ઉપયોગ ન કરવો. પત્રિકા પરના નિર્દેશ મુજબ ઉપયોગ કર્યા પછી કન્ટેનરનો નાશ કરો.

વપરાશ સંબંધિત માર્ગદર્શનઃ

છંટકાવ કરવાનો સમયઃ ફિપ્રોનિલ 0.6% વ/વ જીઆરને કીટક લાગવાની પ્રારંભિક અવસ્થામાં રેતી (50 કિલો રેતી/હેક્ટર) સાથે વાપરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. વાપરવાની રીતઃ દાણાઓની ભલામણપાત્ર માત્રા હસ્તચાલિત ગ્રૅન્યુઅલ ઍપ્લિકેટર અથવા યાંત્રિક ડિસ્પેન્સરનો ઉપયોગ કરીને રેતી સાથે ભેળવીને કરવો જોઇએ. ખેતરમાં 2-3 સેંમીની ઊંડાઇ સુધીનું ભરાયેલું પાણી ઉપલબ્ધ હોવું જોઇએ છંટકાવ પછી 2-3 દિવસો સુધી ખેતરમાં પાણીને ભરેલું રહેવા દો.

સાવચેતીઃ કાળજીપૂર્વક વાપરો. ઉત્પાદનને વાપરતી વખતે શરીરને સુરક્ષા આપતાં કપડાં, રબરનાં હાથમોજાં, રબરના બૂટ, આંખો પર ચશ્મા અને બુકાની પહેરો. આંખો અને ત્વચા સાથેનો સપર્ક ટાળો. પ્રત્યેક છંટકાવ પછી હાથો અને શરીરના દુષિત ભાગોને સારી રીતે ધોઇ નાંખો. છંટકાવ દરમિયાન પીવાનું, ખાવાનું અને ધૂમ્રપાન કરવાનું ટાળો.

ઝેર ચઢ્યાનાં લક્ષણોઃ ઝેર ચઢ્યાનાં ઉગ્ર કિસ્સાઓમાં ઉબકા, ઊલટી, વધુ પડતો પરસેવો અને ઉશ્કેરાટ નજરે પડી શકે છે.

પ્રાથમિક સારવારઃ પેટમાં જાય તોઃ ડૉક્ટરની સલાહ વગર દરદીને ઊલટી કરાવશો નહીં. જો દરદી જાગૃત અને ભાનમાં હોય તો એને પાણીના કોગળા કરાવો. એને 1-2 ગ્લાસ પાણી પીવડાવો. શ્વાસમાં જાય તો-જ્યાં બનાવ બન્યો હોય એ સ્થળેથી દરદીને દૂર લઇ જાઓ, કપડાં ઢીલા કરી નાંખો. જો દરદી શ્વાસ ના લઇ રહ્યો હોય તો મોંથી મોં વાટે શ્વાસ આપો અથવા કૃત્રિમ શ્વાસોચ્છ્વાસ આપો. આંખમાં જાય તો- ઓછામાં ઓછા 15 મિનિટ સુધી સાધારણ તાપમાનના પુષ્કળ પાણી વડે આંખોને ધૂઓ. જો આંખમાં લાલાશ, દુઃખાવો અને બળતરા થાય તો તરત જ આંખના સ્પેશ્યાલિસ્ટ ડૉક્ટરને બોલાવો. ત્વચા પર લાગે તો – પુષ્કળ પાણી વડે એને સારી રીતે ધોઇ નાંખો. જો બળતરા અથવા ફોડલા થાય તો તરત જ ત્વચાના સ્પેશ્યાલિસ્ટ ડૉક્ટરને તરત જ બોલાવો

છોડવા માટે ઝેરીઃ

ઝેરનું મારણઃ કોઈ ચોક્કસ મારણ જાણીતું નથી. લક્ષણોઅનુસાર સારવાર આપો.

વપરાયેલા પાત્રોનો નિકાલઃ 1. ખાલી પાત્રો ભાંગી નાંખવાં અને વસતિથી દૂર દાટી દેવાં. 2. વપરાયેલાં પાત્રો અથવા પૅકેજીસ તેમનો ફરીથી ઉપયોગ થતો રોકવા બહાર રાખવાં નહીં. 3. પૅકેજીસ અને વધારાની સામગ્રી તથો ધોવાણનો એવી સલામત રીતમાં નિકાલ કરવો જેથી પર્યાવરણનું અને જળપ્રદુષણ થતું અટકે.

સંગ્રહની પરિસ્થિતિઓઃ 1. જંતુનાશક ધરાવતાં પૅકેજીસ બીજી ચીજવસ્તુઓ ખાસ કરીને ખોરાકની ચીજ વસ્તુઓ સંગ્રહવાં માટે વપરાતાં ઓરડાઓ અથવા જગ્યાથી દૂર અલગ ઓરડાઓ અથવા જગ્યામાં સંગ્રહવાં અથવા ફુગનાશકના જથ્થા અને પ્રકાર ઉપર આધારિત અલગ કબાટોમાં તાળાં ચાવીમાં બંધ કરીને રાખવાં. 2. જંતુનાશક સંગ્રહવા માટે વપરાતાં ઓરડાઓ અથવા જગ્યા સારી બાંધણી ધરાવતાં, સારો પ્રકાશ ધરાવતાં, સૂકાં, ઠંડકવાળાં, હવાદાર અને પૂરતી મોકળાશ ધરાવતાં હોવાં જોઇએ જેથી વરાળથી પ્રદૂષિત થવાનું ટાળી શકાય.

રાસાયણિક સંયોજનઃ	
ફિપ્રોનિલ (સ.ત.)	0.600%વ/વ
ડાઇસ્ટોન આલ્કોહોલ (સૉલ્વન્ટ)	2.500%વ/વ
ડાયેટોમેસીયસ અર્થ (ફિલર)	1.000%વ/વ
ટ્રાઇસ્ટ્રીલ ફેનોલ ઇથોક્સીલેટ (ઇમલ્સીફાયર)	0.150%વ/વ
એરિથ્રોસિન (ડાઇ)	0.025%વ/વ
રેતી (કેરિયર)	પૂરતાં પ્રમાણમાં%
કુલ	100.000%વ/વ

''ખાલી ડબ્બા ફરીથી ઉપયોગ કરવાનું ખતરનાક છે.''

ਗਰਜ

ਫਿਪ੍ਰੋਨਿਲ ੦.੬ ਭ/ਭ ਦਾਣੇਦਾਰ

(ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ)

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ।

ਫਿਪ੍ਰੋਨਿਲ ੦.੬ ਭ/ਭ ਦਾਣੇਦਾਰ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫਿਪ੍ਰੋਨਿਲ ਦੀ ੬ ਗ੍ਰਾਮ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ, ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਫਿਪ੍ਰੋਨਿਲ ੦.੬ ਭ/ਭ ਦਾਣੇਦਾਰ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋ ਚਾਵਲ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਤਣਾ ਛੇਦਕ ਅਤੇ ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਛਿੱਟੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੁਝਾਅ:

ਫਸਲ(ਾਂ)	ਕੀਟ ਦਾ ਆਮ ਨਾਮ	ਖੁਰਾਕ/ ਹੈਕਟਰ ਏ.ਆਈ. (ਗ੍ਰਾਮ)	ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ (ਕਿਲੋ)	ਪਤਲਾਪਣ	ਪਿੱਛਲੀ ਛਿੜਕ ਤੋਂ ਕਟਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਰੁਕਣ ਦੀ ਮਿਆਦ (ਦਿਨ)	ਹਰ ਅਮਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ-ਦਾਖਲਾ (ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ)
ਚਾਵਲ	ਤਣਾ ਛੇਦਕ ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ	੬੦	੧੦	-	੬੫	-

ਸਾਵਧਾਨੀ:ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਪਰਚੇ ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ।

ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼:

ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਫਿਪ੍ਰੋਨਿਲ ੦.੬ ਭ/ਭ ਦਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਰੇਤ ਸਮੇਤ (@੫੦ ਕਿਲੋ ਰੇਤ / ਹੈਕਟਰ) ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਕੀਟ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ: ਦਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਸੁਝਾਈ ਮਾਤ੍ਰਾ ਨੂੰ ਰੇਤ ਨਾਲ ਰਲਾਕੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਗ੍ਰੈਨੂਲ ਐਪਲੀਕੇਟਰ ਜਾਂ ਮਿਕੈਨੀਕਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ ੨-੩ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ੨-੩ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੋ।

ਸਾਵਧਾਨੀ: ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਿਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਪੜੇ, ਰਬੜ ਦਸਤਾਨੇ, ਰਬੜ ਬੂਟ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਸ਼ਮੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋ। ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ। ਵਰਤੋ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੀਣ, ਖਾਣ ਜਾਂ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇਜ਼ ਕਰੋ।

ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੱਛਣ: ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਅਤੇ ਖਿਜਣਾ - ਇਹ ਸਭ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਜੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ - ਉਲਟੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੀ ਚੂਲੀ ਕਰਵਾਉ। ਪਾਣੀ ਦੇ ੧-੨ ਗਲਾਸ ਦਿਉ। ਜੇ ਸਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ - ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਕਪੜੇ ਢਿੱਲੇ ਕਰੋ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਿਅਲ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਾਹ ਦਿਉ। ਅੱਖ - ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ੧੫ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੇ ਖੂਬ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਜੇ ਲਾਲੀ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਉਤੇਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਝੱਟ ਸੱਦੋ। ਚਮੜੀ - ਖੂਬ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ। ਜੇ ਜਲਨ ਅਤੇ ਛਾਲੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਚਮੜੀ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਝੱਟ ਸੱਦੋ।

ਬੁਰਾ ਅਸਰ:

ਵਿਸ਼ਨਿਵਾਰਕ : ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਵਿਸ਼ਨਿਵਾਰਕ ਨਹੀਂ। ਲੱਛਣਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ: ੧. ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੇ ਬਸਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਬਾ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। ੨. ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਪਏ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤਾਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ੩. ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਡੱਬੇ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਬਚੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਧੋਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸਟੋਰੇਜ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ: ੧. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿਚ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖੋ। ੨. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਪੱਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਸੁੱਕੇ, ਠੰਢੇ, ਹਵਾਦਾਰ, ਰੋਸ਼ਨੀਦਾਰ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹਵਾੜ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਫ਼ੈਲ ਸਕੇ।

ਰਸਾਇਣਕ ਬਣਤਰ:	
ਫਿਪ੍ਰੋਨਿਲ (ਏ.ਆਈ.)	੦.੬੦੦ % ਭ/ਭ
ਡਾਇਐਸੀਟੋਨ ਐਲਕੋਹੌਲ (ਘੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ)	੨.੫੦੦ % ਭ/ਭ
ਡਾਇਐਟੋਮੇਸ਼ਿਅਸ ਮਿੱਟੀ (ਫਿਲਰ)	੧.੦੦੦ % ਭ/ਭ
ਟ੍ਰਾਯਸਟਾਯਰਾਈਲ ਫਿਨੋਲ ਈਥੋਕਸ਼ਾਇਲੇਟ (ਇਮਲਸੀਫਾਇਰ)	੦.੧੫੦ % ਭ/ਭ
ਐਰਿਥ੍ਰੋਸਿਨ (ਡਾਈ)	੦.੦੨੫ % ਭ/ਭ
ਰੇਤ (ਕੈਰੀਅਰ)	ਕਿਉ. ਐਸ. %
ਕੁੱਲ:	੧੦੦.੦੦੦ % ਭ/ਭ

''ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।''

گـــرج

فپرونل ٠.٦٪ڈبلیو/ڈبلیو جی آر

(کیڑے مار دوا)

استعمال کرنے سے پہلے ھدایات کی پرچی پڑھ لیں۔

فپرونل ٠.٦٪ ڈبلیو/ ڈبلیو جی آر فارمولیشن میں ٦ گرام فپرونل فعال مادہ فی کلوگرام فارمولیشن میں موجود ہوتا ہے ۔فپرونل ٠.٦٪ ڈبلیو/ ڈبلیو جی آر ایک حشرات کش دوا ہے جس کا چھڑکاؤ دھان کی فصل میں پتوں پر ڈنٹھل میں سوراخ کرنے والے اور پتوں کو موڑنے والے کیڑوں کی روک تھام کیلئے کیا جاتا ہے۔

استعمال:

فصل	کیڑے کا عام نام	مقدار/ہیکٹر اے آئی (گرام)	فارمولیشن (کلوگرام)	پانی میں محلول	آخری اسپرے اور کٹائی کے درمیان انتظار کا وقفہ (دن)	دوا کے چھڑکاؤ کے بعد دوبارہ چھڑکاؤ (گھنٹوں میں)
دھان	اسٹیم بورر لیف بورر	٦٠	١٠	-	٦٥	-

احتیاطی بیان: لیبل اور ہدایت کی پرچی پر دیئے گئے مقاصد کے علاوہ کسی اور مقصد اور فصلوں کے لئے اس دوا کا استعمال نہ کریں۔ ہدایت کی پرچی پر دی گئی ہدایات کے مطابق استعمال کے بعد دوا کے خالی ڈبوں کو تلف کردیں۔

ہدایات برائے استعمال:

چھڑکاؤ کا وقت: فپرونل ٠.٦٪ ڈبلیو/ ڈبلیو جی آر کا استعمال ریت کے ساتھ (@ ٥٠ کلوگرام ریت فی ہیکٹر) کیڑے لگنے کی بالکل ابتداء میں کرنا چاہیئے۔ دوا کے چھڑکاؤ کا طریقہ: دوا کے دانوں کی ضروری مقدار کو ریت میں ملا کر مشین کے ذریعے یا پھر ہاتھوں سے استعمال ہونے والی مشین سے کھیت میں بکھیر دیں۔ کھیت میں ٣-٢ سینٹی میٹر گہرا پانی موجود ہونا چاہیئے۔ دوا بکھیر دینے کے بعد ٣-٢ دن تک پانی کو کھیت میں ہی رہنے دیں۔

احتیاط: دوا کو استعمال کرتے وقت احتیاط برتیں، ذاتی حفاظت کے کپڑے پہنیں، ربر کے دستانے، ربر کے جوتے حفاظتی چشمے اور چہرے کا ماسک پہنیں۔ آنکھوں اور جلد کو دوا سے مس نہ ہونے دیں۔ ہر مرتبہ دوا کا اسپرے کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں اور دوا سے متاثر جسمانی اعضاء کو خوب اچھی طرح دھولیں۔ دوا کا چھڑکاؤ کرتے وقت کھانے، پینے اور سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں۔

زہر خوراکی کی علامات: زہر خوراکی شدید ہونے پر متلی، قئے، بہت زیادہ پسینہ نکلنا اور بے چینی کا تجربہ ہوسکتا ہے۔

ابتدائی طبی مدد: دوا غلطی سے نگل لینے پر، جب تک علاج کرنے والا ڈاکٹر مشورہ نہ دے، مریض کو قئے نہ کروائیں۔ اگر مریض ہوش میں ہو تو پانی سے کُلی کروائیں اور منہ صاف کریں۔ ٢-١ گلاس پانی پینے کیلئے دیں۔ اگر دوا سانس کے ذریعے جسم میں داخل ہوجائے: مریض کو اس جگہ سے دور لے جائیں، کپڑوں کو ڈھیلا کردیں۔ اگر مریض سانس نہ لے رہا ہو تو اپنے منہ سے مریض کا منہ لگا کر یا مصنوعی طریقے سے تنفس جاری کریں۔ اگر آنکھیں دوا سے متاثر ہوجائیں تو زیادہ مقدار میں عام درجہ حرارت پر صاف پانی سے آنکھوں کو ١٥ منٹ تک خوب اچھی طرح دھوئیں۔ سُرخی، جلن، درد باقی رہنے پر آنکھوں کے ماہر ڈاکٹر کو فوراً بلائیں۔ اگر جلد دوا سے متاثر ہوجائے تو زیادہ مقدار میں پانی سے دھوئیں۔ جلد پر سوزش، جلن اور چھالے نکلنے پر جلد کے امراض کے ماہر ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔

نباتات کیلئے زہریلے اثرات:

تریاق: کوئی خصوصی تریاق نہیں۔ علامات کے مطابق علاج کریں۔

استعمال شدہ کنٹینر کا ضیاع : ١. خالی کنٹینرس کو آبادی سے دور توڑا اور دفن کیا جانا چاہیئے۔ ٢. استعمال شدہ کنٹینر یا پیکیج کو اُن کے دوبارہ استعمال سے بچانے کیلئے باہر نہیں چھوڑنا چاہیئے۔ ٣. خالی پیکیجز یا فاضل مواد اور دھلن کو ایسے محفوظ طریقے سے ضائع کرنا چاہیئے کہ ماحول اور پانی آلودہ ہونے سے روکا جاسکے۔

ذخیرہ اندوزی کی شرطیں : ١. میٹریئل کی موجودگی والے پیکیجرس کو علاحدہ کمروں یا جگہوں پر دیگر چیزوں کو رکھنے کیلئے استعمال کئے جانے والے کمرے یا جگہوں سے دور رکھنا چاہیئے یا میٹریئل کی مقدار اور قسم کے انحصار پر علاحدہ الماریوں میں تالہ بند رکھنا چاہیئے۔ ٢. میٹریئل کو رکھنے والے کمرے یا جگہیں اچھی تعمیر کردہ، خشک، روشن، ہوادار اور بخارات سے آلودہ ہونے سے بچانے کیلئے کافی ڈائمینشنس والے ہوں۔

کیمیائی اجزا:	
فپرونل (اے آئی)	٠.٦٠٠٪وزن/وزن
ڈائی ایسی ٹون الکحل (محلول)	٢.٥٠٠٪وزن/وزن
ڈائی ایٹومیشیس مٹی (مقدار پوری کرنے کیلئے)	١.٠٠٠٪وزن/وزن
ٹریسٹیرل فینول ایتھوکزیلیٹ (ایملسیفائر)	٠.١٥٠٪وزن/وزن
اریتھروسین (رنگ)	٠.٠٢٥٪وزن/وزن
ریت (کیریئر)	٪ مناسب مقدار میں
کل	١٠٠.٠٠٠٪وزن/وزن

خالی کنٹینر کو دوبارہ استعمال کرنا خطرناک ہے۔

DIRECTION FOR USE

FOR AGRICULTURAL USE

कृषि उपयोग के लिए

Read Leaflet Before Use

इस्तेमाल से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें।

Garaj

Fipronil 0.6% w/w GR

(Insecticide)

गरज

फिप्रोनिल ०.६ प्रतिशत जी. आर.

(कीटनाशक)

Marketed by:
GUJARAT INSECTICIDES LIMITED
Plot No.805/806,GIDC Estate, Ankleshwar Dist. Bharuch, Gujarat - 393002.

Manufactured by: Saraswati Agro Chemicals (India) Pvt. Ltd.Regd. Office: Village Dao Majra, Kharar Kurali Road, Distt.S.A.S.Nagar (Mohali),Punjab – 140301.Factory:Lane-2, Phase-1,SIDCO Industrial Complex,Bari Brahmana, Distt. Jammu (J&K)

विक्रेता: **गुजरात इन्सेक्टीसाईडस् लिमिटेड**
प्लॉट नं.:८०५/८०६, जी.आई.डी.सी.एस्टेट अंकलेश्वर, जिला- भरूच,गुजरात-३९३००२

निमाता :सरस्वती एग्रा कमिकल्स (इडिया) प्रा. लि.
रजि. ऑफिस : गाँव दाव माजरा, खरड कुरली रोड, जिला एस.ए.एस. नगर (मोहाली), पंजाब - १४०३०१.
फैक्ट्री: लेन-२, फेस-१, सिडको इण्डस्ट्रीयल कॉम्प्लेक्स, बारी ब्राम्हना, जिला जम्मू (जे एण्ड के)

For any complaints contact Customer care Executive at Gujarat Insecticides Limited,Plot No. 805/806,GIDC Estate,Ankleshwar,Dist.Bharuch, Gujarat-393002.**Tel.:02646 668200**
Email:customercare@gilgharda.com
website: www.gilgharda.com



JM.12.25-01

ENG HIN MAR GUJ PUN URDU

Actual Size - 480mm X 270mm
Date - 18.12.2025

గరజ్
ఫిప్రోనిల్ ౦.6% బ/బ జిఆర్
(కీటకనాశని)

వాడుటకు ముందు కరపత్రమును చదవండి.

ఫిప్రోనిల్ ౦౦.6% బ/బ జిఆర్‌లో ప్రతి కిలో ఫార్ములేషన్‌కి 6 గ్రా ఫిప్రోనిల్ క్రియాశీల పదార్థం ఉంటుంది. వరిలో కాండం తొలుచు పురుగులను మరియు ఆకుముడతను నియంత్రించేందుకు ఆకులపై పిచికారిగా ఫిప్రోనిల్ 0.6% బ/బ జిఆర్ ఫార్ములేషన్‌ని ఉపయోగించాలి.

TEL

ಗರೇಜ್
ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್ 0.6% ತೂ/ತೂ ಜಿಆರ್
(ಕೀಟನಾಶಕ)

ಬಳಕೆಗೆ ಮೊದಲು ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿರಿ.

ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್ 0.6% ತೂ/ತೂ ಜಿಆರ್ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ 6ಗ್ರಾಂ ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕಾಂಶವಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೊ ದ್ರಾವಣದ ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್ 0.6% ತೂ/ತೂ ಜಿಆರ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಭತ್ತದಲ್ಲಿಯ ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ಮತ್ತು ಎಲೆ ಸುರುಳಿ ಕೀಟಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಂಪರಣೆಯಂತೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

KAN

கரஜ்
ஃபிப்ரோனில் 0.6% எ/எ ஜிஆர்
(பூச்சிக்கொல்லி)

உபயோகத்திற்கு முன் பிரசுரத்தை படிக்கவும்.

ஃபிப்ரோனில் 0.6% எ/எ ஜிஆர் கலவையில் ஒரு கிலோ கலவைக்கு 60 கிராம் ஃபிப்ரோனில் தீவிர மூலப்பொருள் அடங்கியுள்ளது. ஃபிப்ரோனில் 0.6% எ/எ ஜிஆர் கலவை நெல் பயிரில் தண்டு துளைப்பான் மற்றும் இலை சுருட்டும் புழுவை கட்டுப்படுத்த இலைத் தெளிப்பாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

TAM

ഗരജ്
ഫിപ്രോനിൽ 0.6% ഡബ്ല്യു/ഡബ്ല്യു ജിആർ
(കീടനാശിനി)

ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ലഘുലേഖ വായിക്കുക

ഫിപ്രോനിൽ 0.6% ഡബ്ല്യു/ഡബ്ല്യു ജിആർ ഫോർമ്യുലേഷനിൽ പ്രതി കിലോഗ്രാം ഫോർമ്യുലേഷനിൽ 6ഗ്രാം ഫിപ്രോനിൽ സക്രിയ ചേരുവ അടങ്ങുന്നു. ഫിപ്രോനിൽ 0.6% ഡബ്ല്യു/ഡബ്ല്യു ജിആർ ഫോർമ്യുലേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെല്ലിലെ തണ്ടു തുരപ്പനെയും ഇലചുരുട്ടിയെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു തളിർ സ്പ്രേ ആയാണ്.

MAL

গরজ
ফিপ্রোনিল ০.৬% ওজন/ওজন জিআর
(কীটনাশক)

ব্যবহারের আগে পত্রিকা পড়া।

ফিপ্রোনিল ০.৬% ওজন/ওজন জিআর ফর্মুলেশনে আছে ফর্মুলেশনের কেজি পিছু ৬ গ্রাঃ ফিপ্রোনিল সক্রিয় উপাদান। ফিপ্রোনিল ০.৬% ওজন/ওজন জিআর ফর্মুলেশন ধানের মাজরা পোকা এবং পাতামোড়া পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্যে পাতায় ছেটোনো হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

BAN

ଗରଜ
ଫିପ୍ରୋନିଲ୍ 0.6% ଡବ୍ଲ୍ୟୁ/ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଜିଆର
(କୀଟନାଶକ)

ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲିଫ୍‌ଲେଟ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ।

ଫିପ୍ରୋନିଲ୍ 0.6% ଡବ୍ଲ୍ୟୁ/ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଜିଆର ସଂରଚନାରେ ରହିଛି ପ୍ରତି କେଜିର ସଂରଚନାରେ 6 ଗ୍ରାମ୍ ଫିପ୍ରୋନିଲ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଉପାଦାନ ଯାହାକୁ ଧାନରେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଓ ପତ୍ରମୋଡ଼ାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଫୋଲିଆର ସ୍ପ୍ରେ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।

ORI

DIRECTION FOR USE

FOR AGRICULTURAL USE
कृषि उपयोग के लिए

Read Leaflet Before Use
इस्तेमाल से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें।

Garaj
Fipronil 0.6% w/w GR
(Insecticide)

गरज
फिप्रोनिल ०.६ प्रतिशत जी. आर.
(कीटनाशक)

Marketed by:
GUJARAT INSECTICIDES LIMITED
Plot No.805/806,GIDC Estate, Ankleshwar
Dist. Bharuch, Gujarat - 393002.

Manufactured by:Saraswati Agro Chemicals (India) Pvt. Ltd.Regd. Office: Village Dao Majra, Kharar Kurali Road, Distt.S.A.S.Nagar (Mohali),Punjab – 140301.Factory:Lane-2, Phase-1,SIDCO Industrial Complex,Bari Brahmana, Distt. Jammu (J&K)

विक्रेताः **गुजरात इन्सेक्टीसाईडस् लिमिटेड**
प्लॉट नं.:८०५/८०६, जी.आई.डी.सी.एस्टेट अंकलेश्वर,
जिला– भरूच,गुजरात–३९३००२

निमाता :सरस्वती एग्रा कमिकल्स (इडिया) प्रा. लि.
रजि. ऑफिस : गाँव दाव माजरा, खरड़ कुरली रोड, जिला एस.ए.एस. नगर (मोहाली), पंजाब – १४०३०१.
फैक्ट्री: लेन–२, फेस–१, सिडको इण्डस्ट्रीयल कॉम्प्लेक्स, बारी ब्राम्हना, जिला जम्मू (जे एण्ड के)

For any complaints contact Customer care Executive at Gujarat Insecticides Limited,Plot No. 805/806,GIDC Estate,Ankleshwar,Dist.Bharuch, Gujarat-393002.**Tel.:02646 668200**
Email:customercare@gilgharda.com
website: www.gilgharda.com



JM.12.25-01