INDOXACARB 14.5% SC   Hind oxa   (INSECTICIDE)

Read Leaflet Before Use.

Indoxacarb 14.5% Suspension Concentrate is a broad spectrum contact and stomach insecticide effective as a foliar spray for the control of insect pests of Cotton, Tomato, Chilli, Cabbage, Pigeonpea, Rice, Soybean & Chickpea.

Recommendation: **Shake well before use**

Crop	Common Name of the Pest	Dosage/ha a.i. (g)	Dosage/ha Formulation (ml)	Dilution in water (liter)	Pre harvest interval (Days)	Re-entry (Days)
Cotton	Bollworm (Helicoverpa armigera)	75	500	600-1000	16	
Cabbage	Diamond back moth (Plutella xylostella)	30-40	200-266	400-750	7	
Tomato	Fruit borer (H. armigera)	60-75	400-500	300-600	5	
Chilli	Fruit borer (H. armigera & Spodoptera exigua)	50-60	333-400	300-600	5	24
Pigeon pea	Pod borer complex (H. armigera, pod fly)	50-60	333-400	500-1000	15	
Rice	Yellow stem borer (Scirpophaga incertulas), Leaf folder (Cnaphalocrosis medinalis)	30-50	200-333	500	37	
Soybean	Tobacco caterpillar (Spodoptera litura)	50	333	500	36	
Chickpea	Pod Borer (H. armigera)	60-75	400-500	500	19	

Good Practices relating to pesticide application techniques Direction of use: Direct spray towards the crop and ensure uniform and proper coverage. It is recommended to use High volume sprayer such as knapsack sprayer, rocking sprayer, foot sprayer etc. fitted with hollow cone nozzle against the target insect pests in different crops as indicated in the above table.

Weather condition (In general): Spray preferably during morning and evening hours. Do not apply on a windy day or before a rain.

Soil and water (where ever applicable): No specific soil & water conditions are prescribed.

Crop stage for Application: May be applied in the recommended crop at any stage of crop growth when the incidence of insect pest is observed to cause economic loss.

Application Techniques: It is recommended to use high volume sprayers fitted with hollow cone nozzle. Shake the bottle well before use. Take the measured quantity of product and add to it a small quantity of water, mix thoroughly and then add remaining quantity of water, stir well before the use. Spray uniformly and insure proper coverage of the spray on the plant.

Equipment Type: It is recommended to use High volume sprayer such as knapsack sprayer, rocking sprayer, foot sprayer etc. fitted with hollow cone nozzle.

Nozzle Type: Hollow cone nozzle

Dosage: Please refer above table for dosage details.

Instruction for Mixing: Take the measured quantity of product and add to it a small quantity of water, mix thoroughly and then add remaining quantity of water, stir well before the use.

Re-entry Period: 24 hours.

Manner & Time of application: May be applied to the above mentioned crops at the interval of 7-10 days when the incidence of insect pests is observed in the field.

Application Timings: Spray preferably during morning and evening hours. Do not apply on a windy day or during rain.

Frequency including max number of sprays: One to two spray at 7-10 days' interval may be applied, when the incidence of insect pests is observed at the dose mentioned in the above table.

Stages during which pesticides should not be applied on any crop: Apply only on stage as instructed in crop stage for application, Do not applied any other stage.

Symptoms of Poisoning: Mild eye irritation with tearing, pain or blurred vision, itching, burning, redness, swelling or rashes on the skin Vapour inhalation may cause irritation of the upper respiratory passages with coughing and discomfort. Based on animal tests, massive overdose might lead to signs of neurotoxicity. Prolonged overexposure would be expected to result in loss of body weight and mild, reversible anemia.

First Aid Measures: If ingested: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induce vomiting until and unless desired by attending physician. If inhaled: Take the person to fresh air and take care of body temperature. If person is not breathing or breathing with difficulty, administer artificial respiration, preferably with mouth to mouth breathing. Consult a physician. In case of skin contact: Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. In case of eye contact: Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists, consult eye specialist.

Antidote: No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Phytotoxicity: Non-phytotoxic at recommended dose

Storage Conditions: 1. Storage and transportation of the plant growth regulator should be done in such a way that no foodstuff and animal feed are contaminated. 2. Store in a cool, dry, well-ventilated, well-built room of sufficient dimensions and in its original containers, away from foodstuff and animal feeds. 3. If leakage or spillage occurs during transportation or storage, necessary measure should be taken to prevent poisoning and pollution of soil and water. Keep out of reach of children.

Safety Precautions: 1. Do not eat, drink, smoke or chew betel leaves while spraying. 2. Wear long sleeves shirt, long pants, chemical resistant gloves, mask, goggles and covered shoes while handling the product. 3. Avoid spray drift onto the spraying person by spraying with the direction of the wind. 4. Do not blow the spray nozzle with mouth, clean the blocked nozzle with a thin stem or brush. 5. In case of any spillage on the body, wash exposed parts with soap and plenty of water 6. Wash hands and unprotected parts of the body properly. Remove and wash contaminated clothing separately after use.

Cautionary Statement: 1. Not to be used for any purpose other than those specified on label and leaflets. 2. Destroy the container after use as directed on leaflet. 3. The product is toxic to honey bees so do not spray during active foraging period of the day. **4. The product is very toxic to aquatic plants, fish and invertebrates and as such may not be used in and around aquaculture.**

Disposal of used containers, washing from equipment and surplus material: 1. It shall be the duty of manufactures, formulators of insecticides and operators to dispose packages or surplus material and washings in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. The packages shall be broken and buried away from habitation.

Chemical Composition:

Content		% w/w
Indoxacarb a.i.	active ingredient	14.50
Inactive enantiomer	other ingredient	6.00
Amorphous silicon dioxide	other ingredient	7.00
Polyethoxylated polyaryl phenol	other ingredient	9.00
Polyethoxylated polyaryl phenol phosphate	other ingredient	6.00
Distilled methyl soyate	other ingredient	57.50
Total		**100.00% w/w**

" DANGEROUS TO RE USE EMPTY CONTAINER "

English

इन्डोक्साकार्ब १४.५% एस.सी.   हिन्द ऑक्सा   (कीटनाशक)

इस्तेमाल से पहले संलग्न पत्रिका पढ़े ।

इन्डोक्साका १४.५ प्रतिशत स्राव्य घोल एक सम्पर्क व पेट में असर करने वाला कीटनाशक है जो कपास, पत्तागोभी, टमाटर, मिर्च, तूर, धान, सोयाबीन और चना पर लगने वाले निम्नलिखित कीट पर पर्णीय छिड़काव पर प्रभावकारी है।

सिफारिश :   उपयोग करने से पहले बोतल को अच्छी तरह से हिलायें

फसल	कीड के सामान्य नाम	खुराक प्रति हैक्टर सकीय तत्व (ग्रा.)	खुराक प्रति हैक्टर संरचना (मिली)	पानी की मात्रा (ली.)	फसल कटाई से पूर्व का अंतराल (दिन)	पुन: प्रवेश की अवधि (घंटे)
कपास	डोडे की सुडी	७५	५००	६००–१०००	१६	
पत्तागोभी	हीरा पीठ पतंगा	३०–४०	२००–२६६	४००–७५०	७	
टमाटर	फल छेदक	६०–७५	४००–५००	३००–६००	५	
मिर्च	फल छेदक	५०–६०	३३३–४००	३००–६००	५	२४
तूर	फली छेदक समूह	५०–६०	३३३–४००	५००–१०००	१५	
धान	पीला तना छेदक, पत्ता लपेट	३०–५०	२००–३३३	५००	३७	
सोयाबीन	तंबाखू इल्ली	५०	३३३	५००	३६	
चना	फल छेदक कीडे	६०–७५	४००–५००	५००	१९	

कीटनाशक अनुप्रयोग तकनीक से संबंधित अच्छे अभ्यास, उपयोग के लिए निर्देश: फसल की ओर सीधा, एकसमान और उचित कवरेज से छिड़काव करें। तालिका में दिए गए संकेत के अनुसार विभिन्न फसल में लक्ष्य कीट के खिलाफ होलो कोन नोजल के साथ फिट किए गए उच्च मात्रा वाले स्प्रेयर जैसे कि नैपसैक स्प्रेयर, किंग या फूट स्प्रेयर का उपयोग करने की फिरकी जाती है।

मौसम की स्थिति: विशेषत: सुबह और शाम के घंट के दौरान छिड़काव करें। बारिश या तेज हवा हो तब छिड़काव न करें।

मिट्टी और पानी : मिट्टी और पानी की कोई विशिष्ट स्थिति निर्धारित नहीं है ।

फसल अवस्था : फसल की वृद्धि के किसी भी चरण में छिड़काव किया जा सकता है, जब फीट का प्रकोप होने पर आर्थिक नुकसान होने की संभावना है ।

आवेदन तकनीक: होलो कोन नोजल के साथ फिट किए गए उच्च मात्रा वाले स्प्रेयर की सिफारिश की जाती है। उत्पाद की मापित मात्रा लें और उसमें थोड़ी मात्रा में पानी डालें फिर शेष मात्रा में पानी डालें। उपयोग करने से पहले अच्छी तरह से हिलाएं। फसल की ओर सीधा, एकसमान और उचित कवरेज से छिड़काव करें।

उपकरण प्रकार : होलो कोन नोजल के साथ फिट किए गए उच्च मात्रा वाले स्प्रेयर जैसे कि नैपसैक स्प्रेयर, रॉकिंग स्प्रेयर, फूट स्प्रेयर का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

नोजल प्रकार : होलो कोन नोजल

खुराक : खुराक विवरण के लिए कृपया उपरो तालिका देखें ।

मिश्रण के लिए निर्देश: उत्पाद की मापित मात्रा लें और उसमें थोड़ी मात्रा में पानी डाले फिर शेष मात्रा में पानी डालें। उपयोग करने से पहले अच्छी तरह से हिलाएं।

पुन: प्रवेश अवधि : २४ घंटे

आवेदन का समय और तरीका: उपरोक्त फसल में कीट का प्रकोप होने पर ७–१० दिन के अंतराल पर निर्देशित फसल पर छिड़काव किया जा सकता है।

आवेदन का समय: विशेषत: सुबह और शाम के घंट के दौरान छिड़काव करें। बारिश या तेज हवा हो तब छिड़काव न करें।

अधिक से अधिक अंक सहित आवृति: उपरो तालिका में बताई गई खुराक खेत में कीट का प्रकोप होने पर ७–१० दिन के अंतराल में एक से दो छिड़काव किए जा सकते है।

चरण जिसके दौरान किसी भी फसल पर कीटनाशक नहीं लगाया जाना चाहियें: फसल अवस्था में दिए गए निर्देशानुसार ही छिड़काव करें, किसी अन्य चरण में छिड़काव न करें।

विष के लक्षण: आँख में जलन, पानी आना व धुंधला दिखना त्वचा पर खुजली, जलन व परेशानी हो सकती है। सूंघने पर खांसी और परेशानी हो सकती है। जानवर पर किए गए प्रयोग के आधार पर आवश्यकता से काफी अधिक मात्रा से तंत्रिकाओं विषारा प्रभावित हो सकती है। लंबे समय तक रसायन के प्रभाव में आने से शरीर के भर में कमी तथा अल्पकालिक अनीमिया हो सकता है।

पादपआविषालुता: कीटनाशक की सिफारिश के अनुसार इस्तेमाल करने पर कोई पौधो के लिए विषाता नहीं।

प्राथमिक उपचार: अगर मुंह में निगल लिया है: यदि व्यक्ति सचेत और सतर्क है, तो पानी में मुंह कुल्ला करायें और पिने के लिए १ या २ गिलास पानी दें। एक बेहोश व्यक्ति को मुंह से कुछ भी कभी नहीं दें। डॉक्टर को बुलायें। बिना उपस्थित चिकित्सक की सलाह उल्टी न कराये। यदि साँस में लिए जाने पर: रोगी को ताजी हवा में लें जाए और शरीर के तापमान का ख्याल रखें। यदि रोगी साँस नहीं ले रहा है या कठिनाई से साँस ले रहा है, तो कृत्रिम आसनों, एक चिकित्सक से परामर्श करें। त्वचा के संपर्क के मामले में: शरीर के प्रभावित हिस्से को अच्छी तरह से साबुन से धोए और बाल और नाखून सहित पानी का खूब इस्तेमाल करें। यदि दर्द, लालिमा या जलन बानी रहती है, तो डॉक्टर से परामर्श करें। सभी दूषित कपड़े को अलग किया जाना चाहिये और उपयोग से पहले साबुन और पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए। आँख के संपर्क के मामले में: कम से कम १५ मिनिट के लिए बहुत सारे पानी से धीरे – धीरे धोए। यदि दर्द, जलन, लालिमा या फोटोफोबिया बनी रहती है तो नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह ले।

विष नाशक: कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें।

संग्रहण की शर्ते: १. इसका संग्रह तथा परिवहन इस तरह से किया जाए जिससे बचे,घरेलू जानवर खाने–पीने को समान तथा पशुआहार दूषित न हो। २. कीटनाशक को इसके असली डिब्बे में खाद्य पदार्थ और पशुआहार से दूर रखें। सग्रह की जगह सूखी ठंडी हो जिसका निर्माण सही ढंग से किया गया हो । जगह लम्बी चौड़ी हवादार और रोशनीदार हो ३. इसके संग्रह या परिवहन के समय यदि पौध वर्धक नियंत्रक गिर या फैल रहा हो तो जमीन और पानी को जहरिला या प्रदूषित होने से रोकने के लिए जओरी उपाय शीख करें । बच्चे के पहुंच से दूर रखें।

सुरक्षा के लिए सावधानियाँ: १. प्रोडक्ट का प्रयोग करते समय न कुछ खाएं, न पियें, धुम्रपान करें, न ही पान चबाएं । २. प्रोडक्ट का प्रयोग करते समय पुरे बांह की शर्ट, लंबी पैंट, रासायनिक प्रतिरोधी दस्ताने, मास्क, चश्मा और ढके हुए जूते पहने। ३. हवा की दिशा के साथ छिड़काव करते हुए छिड़काव करने वाले व्यक्ति पर स्प्रे के बहाव से बचें। ४. स्प्रे नोजल को मुंह से न खोलें अब नोजल को पतली सिंक या श से साफ करें। ५. शरीर पर किसी भी रिसाव की स्थिति में, खुले हिस्स को साबुन और काफी सारे पानी से धोएं। ६. हाथ और शरीर के खुले हिस्से को अच्छी तरह से धोएं। प्रयोग के बाद दूषित कपडे को उतारकर धोएं।

सावधानी कथन: १. लेबल और पत्रक पर जो निदिष्ट है उसके अलावा अन्य किसी प्रयोजन से प्रयोग न किया जाए। २. पत्रक के निर्देशानुसार उपयोग के पांत आन को नई करें। ३. उत्पाद मधु मक्खिया के लिए विषा है इसलिए दिन में सक्रिय फोर्जिंग अवधि के दौरान छिड़काव न करें। **४. यह उत्पाद जलीय पौध, मछलिय और अकशेकीय जीव के लिए बहुत विषैला होता है इसलिए इसका उपयोग जलीय कृषि में और उसके आसपास नहीं किया जाना चाहियें।**

कीटनाशक के प्रयोग किये गए डिब्बे बचे हुही कीटनाशको तथा पात्र के धोवन का निपटारा : १. यह कीटनाशक के निर्माताओं, ऑपरेटर फॉर्मूलेटर का कर्तव्य होगा की पर्यावरणीय या जल प्रदूषण को रोकने की लिए एक सुरक्षित तरीके से पंकज या अधिशेष सामग्री और धोवन का निपटारा न करें। २. उपयोग किए हुए पंकज को खुले में न छोड़े ताकि उनका पुनपयोग ना किया जा सके। ३. पॅकेज को तोड़कर आबादी से दूर जमीन के निचे गाड़ दें।

रासायनिक संरचना:

घटक		%भा/भा
ईन्डोसकर्ज ए.आई.	सक्रिय घटक	१४.५०
निष्क्रिय इनैनटिओमेर	अन्य घटक	६.००
अमोरफस सिलिकॉन डाइऑक्साइड	अन्य घटक	७.००
पॉलीएथोक्सिलेटेड पॉलीएरिल फिनोल	अन्य घटक	९.००
पॉलीएथोक्सिलेटेड पॉलीएरिल फिनोल फॉस्फेट	अन्य घटक	६.००
डिस्टिल्ड मिथाइल सोयाएट	अन्य घटक	५७.५०
कुल		१००.००% भा/भा

" खाली कंटेनर का दोबारा उपयोग करना खतरनाक है। "

Hindi

इंडोक्साकार्ब १४.५% एस.सी.   हिन्द ऑक्सा   (कीटकनाशक)

वापरण्यापूर्वी माहिती पत्रक वाचा.

इंडोक्साकार्ब १४.५% सस्पेन्शन कॉन्सन्ट्रेट हे एक बहुविध क्रियाशील असणारे स्पर्शजन्य आणि पोटविष कीटकनाशक आहे जे कपाशी, टोमॅटो, मिरची, कोबी, तूर, तांदूळ, सोयाबीन आणि हरभरा ह्यांवरील कीटकांच्या नियंत्रणासाठी पानांवरील फवारणी स्वरूपात प्रभावी ठरते.

शिफारस :   वापरण्यापूर्वी चांगले हलवा

पीक	किडीचे सामान्य नाव	मात्रा / हे क्रि.घ. (ग्रॅ).	मात्रा / हे सूत्रीकरण (मिली)	पाण्यामधील विरलन	कापणीपूर्वीचे कालांतर (दिवस)	पुन:प्रवेश कालावधी (दिवस)
कपाशी	बोंडअळी (हेलिकोव्हेर्पा आर्मिगेरा)	७५	५००	६००–१०००	१६	
कोबी	पाकोळी (DBM) (प्लुटेला झायलोस्टेला)	३०–४०	२००–२६६	४००–७५०	७	
टोमॅटो	फळ पोखरणारी अळी (एच. आर्मिगेरा)	६०–७५	४००–५००	३००–६००	५	
मिरची	फळ पोखरणारी व लष्करी अळी	५०–६०	३३३–४००	३००–६००	५	२४
तूर	शेंगा पोखरणारी अळी वर्गीय (एच. आर्मिगेरा, शेंडे माशी)	५०–६०	३३३–४००	५००–१०००	१५	
तांदूळ	पिवळा खोड कीड (स्किर्पोफागा इन्सर्च्युलास), पाने गुंडाळणारी अळी (नाफालोक्रोसिस मेडिनालिस)	३०–५०	२००–३३३	५००	३७	
सोयाबीन	लष्करी अळी (स्पोडोप्टेरा लिटुरा)	५०	३३३	५००	३६	
हरभरा	घाटे अळी (एच. आर्मिगेरा)	६०–७५	४००–५००	५००	१९	

कीटनाशक वापरण्याच्या तंत्राशी निगडित चांगल्या प्रथा, वापरासाठीचे निर्देश : पिकावर थेट फवारणी करा आणि पीक एकसमानपणे व व्यवस्थित व्यापले जाईल ह्याची खात्री करा. पोकळ कोनाचे नोझले बसवलेले नॅपसॅक स्प्रेयर, रॉकिंग स्प्रेयर, फूट स्प्रेयर, इ. सारखे जास्त आकारमानाचे स्प्रेयर वरील तक्त्यामध्ये दाखवल्यानुसार विविध पिकांवरील कीटकांना लक्ष्य करण्यासाठी वापरावेत.

हवामानाच्या परिस्थिती (सर्वसाधारण): शक्यतो सकाळी आणि संध्याकाळी फवारणी करा. सोसाट्याचा वारा असताना किंवा पावसापूर्वी फवारू नका.

माती आणि पाणी (जिथे लागू असेल तिथे): माती आणि पाण्याच्या कोणत्याही विशिष्ट परिस्थिती विहित केलेल्या नाहीत.

वापरासाठी पिकावस्था : किडीचा प्रादुर्भाव आर्थिक नुकसान करण्याएवढा दिसून आल्यावर सुचवलेल्या पिकावर पिकाच्या कोणत्याही अवस्थेत वापरता येईल.

वापराचे तंत्र : पोकळ कोनाचे नोझल बसवलेले जास्त आकारमानाचे स्प्रेयर वापरावेत. वापरपूर्वी बाटली नीट हलवून घ्या. उत्पादन मोजून घ्या आणि त्यात थोडे पाणी घालून व्यवस्थित मिसळून घ्या आणि मग उरलेले पाणी घाला. वापरापूर्वी व्यवस्थित ढवळून घ्या. एकसमानपणे फवारणी करा आणि झाडाला फवारणीने पूर्ण व्यापले जाईल ह्याची खात्री करा.

उपकरणाचा प्रकार : पोकळ कोनाचे नोझले बसवलेले नॅपसॅक स्प्रेयर, रॉकिंग स्प्रेयर, फूट स्प्रेयर, इ. सारखे जास्त आकारमानाचे स्प्रेयर वापरावेत.

नोझलचा प्रकार : पोकळ कोनाचे नोझल (टोटी)

मात्रा : कृपया मात्रेच्या तपशिलासाठी वरील तक्त्याचा संदर्भ घ्या.

मिश्रणासाठी सूचना :
उत्पादन मोजून घ्या आणि त्यात थोडे पाणी घालून व्यवस्थित मिसळून घ्या आणि मग उरलेले पाणी घाला. वापरापूर्वी व्यवस्थित ढवळून घ्या.

पुन: प्रवेश कालावधी : २४ तास

वापराची पद्धत आणि वेळ : उपरोक्त पिकांवर शेतात कीटकांचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यावर ७ ते १० दिवसांच्या कालांतराने फवारता येईल.

वापराच्या वेळा : शक्यतो सकाळी आणि संध्याकाळी फवारणी करा. सोसाट्याचा वारा असताना किंवा पावसापूर्वी फवारू नका.

वारंवारता आणि फवारण्यांची कमाल संख्या : किडीचा प्रादुर्भाव दिसून आल्यावर उपरोक्त तक्त्यामध्ये उल्लेखित मात्रेत ७ ते १० दिवसांच्या कालांतराने एक–दोन फवारण्या करता येतील.

कोणत्या अवस्थेमध्ये कोणत्याही पिकावर कीटनाशके फवारू नयेत : वापरासाठीच्या पीकावस्थेमध्ये दिलेल्या सूचनेनुसारच फवारणी करा. इतर कोणत्याही अवस्थेत करू नका.

विषबाधेची लक्षणे : डोळ्यात सौम्य जळजळ आणि अश्रू येणे, वेदना किंवा धूसर दृष्टी, त्वचेवर खाज, दाह, लालसरपणा, सूज किंवा पुरळ. बाष्प हुंगल्यास वरील श्वसनमार्गाची जळजळ होऊ शकते आणि खोकला व त्रास होऊ शकतो. पशुंवरील चाचण्यांनुसार, मोठ्या मात्रेमुळे चेताविषजन्यता उद्भवू शकते. दीर्घकाळ संपर्कात राहिल्याने शरीराचे वजन घटणे आणि सौम्य, न परतवता येणारा पंडुरोग होणे अपेक्षित आहे.

प्रथमोपचार : पोटात गेल्यास : जर व्यक्ती शुद्धीत आणि सावध असेल, तर पाण्याने चूळ भरा किंवा १–२ पेले पाणी प्यायला द्या. बेशुद्ध व्यक्तीला तोंडावाटे काहीही कधीही देऊ नका. डॉक्टरांना बोलवा. उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांनी सांगितल्याशिवाय उलटी काढू नका. हुंगल्यास : रुग्णाला मोकळ्या हवेत न्या आणि शरीराचे तापमान जपा. जर माणूस श्वास घेत नसेल किंवा श्वास घेण्यास त्रास होत असेल, तर कृत्रिम श्वसन द्या, शक्यतो तोंडाने तोंडावर. डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. त्वचेशी संपर्क झाल्यास : शरीराचे बाधित भाग साबणाने व पाण्याने स्वच्छ धुवून काढा, अगदी केस आणि नखेसुद्धा. जर वेदना, जळजळ, लालसरपणा किंवा जळजळ कायम राहिली, तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. सर्व दूषित कपडे पुन्हा वापरापूर्वी वेगळे करून व्यवस्थित साबणानेव पाण्याने धुवावेत. डोळ्यांत गेल्यास : भरपूर पाण्याने १५ मिनिटे धूत राहा. जर वेदना, जळजळ, लालसरपणा किंवा प्रकाशसंवेदनशीलता कायम राहिली, तर नेत्रचिकित्सकाकडे न्या.

उतारा : कोणताही विशिष्ट उतारा नाही. लक्षणानुसार उपचार करा.

वनस्पती विषजन्यता : सुचविलेल्या मात्रेमध्ये वनस्पतीसाठी विषारी नाही.

साठवणीच्या परिस्थिती : १. वनस्पती वृद्धी नियामकाची साठवण आणि वाहतूक अशा रीतीने करावी ज्यायोगे कोणताही अन्नपदार्थ आणि पशुखाद्य दूषित होऊ नये. २. थंड, कोरड्या, सुप्रकाशित, सुबद्ध, पुरेशा मोजमापाच्या खोलीमध्ये आणि मूळ कंटेनरमध्ये, अन्नपदार्थांपासून आणि पशुखाद्यापासून दूर साठवण करा. ३. जर वाहतुकीदरम्यान किंवा साठवणीदरम्यान गळती झाली किंवा उत्पादन सांडले, तर मातीचे व पाण्याचे प्रदूषण व विषबाधा टाळण्यासाठी आवश्यक ते उपाय करावे. मुलांच्या हाती लागू देऊ नका.

सुरक्षेसाठी खबरदाऱ्या : १. फवारणी करताना काहीही खाऊ नका, पिऊ नका, धूम्रपान करू नका किंवा पान चघळू नका. २. उत्पादन हाताळताना लांब हाताचा सदरा, लांब विजार (पँट), रसायनविरोधी हातमोजे, मास्क, गॉगल आणि पाय झाकणारे शूज घाला. ३. फवारणाऱ्या व्यक्तीच्या अंगावर फवारा उडू नये म्हणून वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करा. ४. फवारणीचे नोझल तोंडाने फुंकू नका. चोंदलेले नोझल बारीक काडीने किंवा ब्रशने साफ करा. ५. अंगावर सांडल्यास उघडे भाग साबणाने व पाण्याने धुवून काढा. ६. हात आणि शरीराचे असुरक्षित भाग स्वच्छ धुवा. दूषित कपडे वापरानंतर वेगळे काढा आणि धुवा.

सावधानतेचा इशारा : १. पत्रकात आणि पुस्तिकेत दिलेल्या पिकांखेरीज इतर कशावरही वापरू नये. २. वापरानंतर पुस्तिकेत निर्देश दिल्याप्रमाणे कंटेनर नष्ट करा. ३. हे उत्पादन मधमाश्यांसाठी विषारी आहे म्हणून दिवसा त्या सक्रिय असताना फवारणी करू नका. **४. उत्पादन जलवनस्पतींसाठी, माशांसाठी आणि अपृष्ठवंशीय प्राण्यांसाठी अतिशय विषारी आहे आणि म्हणून जल परिसंस्थेमध्ये आणि त्या सभोवतालीत त्याचा वापर करू नये.**

वापरलेल्या कंटेनरची, उपकरणातील धुवणाची आणि उर्वरित पदार्थांची विल्हेवाट : १. पॅकेजेस, उर्वरित पदार्थ आणि धुवणे ह्यांची सुरक्षित पद्धतीने, पर्यावरणाचे किंवा पाण्याचे प्रदूषण होणार नाही अशा रीतीने विल्हेवाट लावणे हे उत्पादकांचे, कीटकनाशकांच्या सूत्रीकर्त्यांचे आणि वापरकर्त्यांचे कर्तव्य असेल. २. वापरलेली पॅकेजेस पुन्हा वापरली जाऊ नयेत म्हणून ती बाहेर सोडून देऊ नये. ३. वापरलेली पॅकेजेस मोडून मानवी वस्तीपासून दूर नेऊन पुरावीत.

रासायनिक संघटन :

पदार्थ		%भार / भार
इंडॉक्साकार्ब क्रि.घ.	क्रियाशील घटक	१४.५०
निष्क्रिय एनॅन्शिओमर	इतर घटक	६.००
एमॉर्फस सिलिकॉन डायऑक्साइड	इतर घटक	७.००
पॉलीइथॉक्झायलेटेड पॉलीॲरिल फेनोल	इतर घटक	९.००
पॉलीइथॉक्झायलेटेड पॉलीॲरिल फेनोल फॉस्फेट	इतर घटक	६.००
उर्ध्वपतित मिथाइल सोयेट	इतर घटक	५७.५०
एकूण :		१००.०० % भार / भार

" रिकामे कंटेनर पुन्हा वापरणे धोकादायक आहे."

Marathi

ઈન્ડોક્સાકાર્બ ૧૪.૫% એસસી   હિંદ ઓક્સા   (ડીટકનાશક)

વાપરતાં પહેલાં પત્રિકા વાંચો.

ઈન્ડોક્સાકાર્બ ૧૪.૫% સસ્પેન્શન કોન્સન્ટ્રેટ એ એક વ્યાપક સ્પેક્ટ્રમ સંપર્ક અને પેટની જંતુનાશક છે જે કપાસ, ટામેટા, મરચાં, કોબી, તુવેર, ચોખા, સોયાબીન અને ચણાના નિયંત્રણ માટે પર્ણસમૂહના છંટકાવ તરીકે અસરકારક છે.

ભલામણઃ   ઉપયોગ કરતા પહેલા સારી રીતે હલાવો

પાક	જંતુનાં સામાન્ય નામ	માત્રા/હેક્ટર સ.ધ. (ગ્રા)	માત્રા/હેક્ટર ફોર્મ્યુલેશન (મિલિ)	મંદન માટે પાણી (લિટર)	લણણીપૂર્વ સમયાંતર (દિવસો)	પુનઃપ્રવેશ સમયગાળો (દિવસો)
કપાસ	બોલવોર્મ (હેલિકોવર્પા આર્મિજેરા)	75	500	600-1000	16	
કોબી	ડાયમંડ બેક મોથ (પ્લુટેલા ઝાયલોસ્ટેલા)	30-40	200-266	400-750	7	
ટમેટાં	ફ્રુટ બોરર (એચ. આર્મિજેરા)	60-75	400-500	300-600	5	
મરચાં	ફ્રુટ બોરર (એચ. આર્મિજેરા) અને (સ્પોડોપ્ટેરા એક્સિગુઆ)	50-60	333-400	300-600	5	24
તુવેર	પોડ બોરર કોમ્પ્લેક્સ (એચ. આર્મિજેરા, પોડ ફ્લાય)	50-60	333-400	500-1000	15	
ડાંગર	યલો સ્ટેમ બોરર (સ્કિર્પોફેગા ઇન્સર્ટ્યુલાસ), લીફ ફોલ્ડર (ક્નેફાલોક્રોસિસ મેડિનાલિસ)	30-50	200-333	500	37	
સોયાબીન	પોડ બોરર (એચ.આર્મિજેરા)	50	333	500	36	
ચણા	બોલવોર્મ (હેલિકોવર્પા આર્મિજેરા)	60-75	400-500	500	19	

જંતુનાશક ઉપયોગની રીતો અંગે ઉત્તમ કાર્યપદ્ધતિઓ, ઉપયોગ અંગે નિર્દેશઃ પાક તરફ સીધો છંટકાવ કરો અને એકસમાન અને યોગ્ય રીતે આવરી લેવાનું સુનિશ્ચિત કરો. ઉપરોક્ત કોષ્ટકમાં દર્શાવ્યા મુજબ વિવિધ પાકોમાં લક્ષિત જંતુનાશકો સામે હૉલો કોન નોઝલ ફીટ કરેલા નેપસેક સ્પ્રેયર, ફૂટ સ્પ્રેયર વગેરે જેવા હાઇ વૉલ્યૂમ સ્પ્રેયરનો ઉપયોગ ભલામણ કરવામાં આવે છે.

હવામાન સ્થિતિ (સામાન્ય રીતે): મુખ્યત્વે સવારના કલાકો દરમિયાન છંટકાવ કરો. પવનવાળા દિવસે અથવા વરસાદ પહેલાં છંટકાવ કરવો નહીં.

માટી અને પાણી (જ્યાં પણ લાગુ હોય): માટી અને પાણી અંગે કોઈ ચોક્કસ શરતો સૂચવવામાં આવી નથી.

વપરાશ માટે પાકનો તબક્કોઃ જ્યારે કીટકોનો ઉપદ્રવ આર્થિક નુકસાની પહોંચાડતો જોવા મળે ત્યારે પાકની વૃદ્ધિના કોઈપણ તબક્કે ભલામણ કરેલા પાકોમાં ઉપયોગ કરી શકાય છે.

ઉપયોગની પદ્ધતિઓઃ હૉલો કોન નોઝલ લગાડેલા હાઇ વૉલ્યૂમ સ્પ્રેયરનો ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. ઉપયોગ કરતાં પહેલાં બાટલીને સારી રીતે હલાવો. ઉત્પાદનની માપેલી માત્રા લો અને તેમાં થોડા પ્રમાણમાં પાણી ઉમેરો, સારી રીતે મિક્સ કરો અને પછી બાકીનું પાણી ઉમેરો, ઉપયોગ કરતાં પહેલાં સારી રીતે હલાવો. એકસરખી રીતે છંટકાવ કરો અને સારી રીતે આવરી લેવાનું સુનિશ્ચિત કરો.

સાધનોનો પ્રકારઃ હૉલો કોન નોઝલ લગાડેલા હાઇ વૉલ્યૂમ સ્પ્રેયરનો ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

નોઝલનો પ્રકારઃ હૉલો કોન નોઝલ

માત્રાઃ માત્રાની વિગતો માટે કૃપા કરીને ઉપરનું કોષ્ટકનો જૂઓ.

મિશ્રણ માટેની સૂચનાઓઃ માપેલી માત્રામાં ઉત્પાદન લો અને તેમાં થોડી માત્રામાં પાણી ઉમેરો, સારી રીતે મિક્સ કરો અને પછી બાકીનું પાણી ઉમેરો, ઉપયોગ કરતાં પહેલા સારી રીતે હલાવો.

પુનઃપ્રવેશ અવધિઃ ૨૪ કલાક

વપરાશનો સમયઃ મુખ્યત્વે સવારના કલાકો દરમિયાન છંટકાવ કરો. પવનવાળા દિવસે અથવા વરસાદ પહેલાં છંટકાવ કરવો નહીં.

છંટકાવની મહત્તમ સંખ્યા સહિત આવર્તનઃ જ્યારે કીટકોનો ઉપદ્રવ જોવા મળે ત્યારે, ઉપરોક્ત કોષ્ટકમાં દર્શાવેલી માત્રામાં ૭–૧૦ દિવસના અંતરે એક અથવા બે છંટકાવ કરી શકાય છે.

એ તબક્કાઓ જ્યારે કોઈપણ પાક પર જંતુનાશકો વાપરવા ન જોઈએઃ પાકના તબક્કામાં માત્ર સૂચના મુજબ જ ઉપયોગ કરો. અન્ય કોઈ તબક્કામાં વાપરશો નહીં.

ઝેરની અસરનાં લક્ષણોઃ આંખમાં અશ્રુઓ સહિત, હળવી બળતરા, દુખાવો અથવા દૃષ્ટિમાં ઝાંખપ, ખંજવાળ, બળતરા, લાલાશ, સોજો અથવા ત્વચા પર ફોલ્લીઓ થઈ શકે છે. બાષ્પ શ્વાસમાં લેવાથી ઉધરસ અને અસ્વસ્થતા સાથે ઉપલા શ્વસન માર્ગોમાં બળતરા થઈ શકે છે. પ્રાણીઓ પરનાં પરીક્ષણોના આધારે, મોટા પ્રમાણમાં ઓવરડોઝને લઈને ન્યુરોટોક્સિસિટીનાં ચિહ્નો ઉદ્ભવી શકે છે. લાંબા સમય સુધી વધુ પડતા પ્રભાવની અસરથી શરીરના વજનમાં ઘટાડો અને હળવી, ઉલટાવી શકાય એવી રક્તક્ષીણતા થવાની સંભાવના રહે છે.

પ્રાથમિક ઉપચારના ઉપાયો: જો પેટમાં લેવામાં આવે તોઃ જો વ્યક્તિ સભાન અને સચેત હોય, તો પાણીથી મોં ધોઈ નાખો અને પીવા માટે ૧ કે ૨ ગ્લાસ પાણી આપો. બેભાન વ્યક્તિને ક્યારેય મોઢેથી કંઈ ન આપવું. ડોક્ટરને બોલાવો. હાજરી આપનાર ચિકિત્સક દ્વારા જણાવવામાં ન આવે ત્યાં સુધી ઉલ્ટી કરાવવા પ્રયાસ ન કરશો. જો શ્વાસ લેવામાં આવે તોઃ દર્દીને તાજી હવામાં લઈ જાઓ અને શરીરના તાપમાનનું ધ્યાન રાખો. જો વ્યક્તિને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડતી હોય અથવા શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થતી હોય તો, બની શકે તો, મોંથી મોં શ્વાસ આપીને કૃત્રિમ શ્વાસોચ્છવાસ આપો. ચિકિત્સકની સલાહ લો. ત્વચાના સંપર્કના કિસ્સામાંઃ વાળ અને નખની નીચે સહિત, શરીરના પ્રભાવિત ભાગને સાબુ અને પુષ્કળ પાણીથી સારી રીતે ધોઈ લો. જો દુખાવો, લાલાશ અથવા બળતરા ચાલુ રહે, તો ડોક્ટરની સલાહ લો. બધાં દૂષિત કપડાંને અલગ–અલગ રાખવાં જોઈએ અને ઉપયોગ કરતાં પહેલાં સાબુ અને પાણીથી અલગથી સારી રીતે ધોવાં જોઈએ. આંખના સંપર્કના કિસ્સામાંઃ ઓછામાં ઓછી ૧૫ મિનિટ સુધી પુષ્કળ પાણીથી હળવા હાથે પાણીની છાલકો મારીને ધૂઓ. જો પીડા, બળતરા, લાલાશ અથવા ફોટોફોબિયા ચાલુ રહે તો, નેત્ર–વિશેષજ્ઞની સલાહ લો.

વિષમારણ: કોઈ ચોક્કસ વિષમારણ જાણીતું નથી. લાક્ષણો અનુસાર ઉપચાર લાગુ કરો.

ફાયટોટોક્સિસિટી: ભલામણ કરેલી માત્રા પર બિન–ફાઈટોટોક્સિક.

સંગ્રહ સ્થિતિઓ : ૧. છોડના વિકાસ નિયંત્રકનો સંગ્રહ અને પરિવહન એવી રીતે થવાં જોઈએ કે, કોઈપણ ખાદ્ય પદાર્થો અને પશુ આહાર દૂષિત ન થાય. ૨. શીતળ, સૂકા, સારી રીતે વેન્ટિલેટેડ, પર્યાપ્ત પરિમાણો ધરાવતી સારી રીતે બંધાએલી રૂમમાં અને તેના મૂળ કન્ટેનરમાં, ખાદ્ય પદાર્થો અને પ્રાણીઓના ખોરાકથી દૂર સંગ્રહિત કરો. ૩. જો પરિવહન અથવા સંગ્રહ દરમિયાન લીકેજ અથવા છલકાવાનું થાય છે, ઝેરની અસર ન ફેલાય અને જમીન તથા પાણીમાં વિષાક્તતા અને પ્રદૂષણને રોકવા માટે જરૂરી પગલાં લેવાં જોઈએ. બાળકોની પહોંચથી દૂર રાખો.

સુરક્ષા સાવચેતીઓઃ ૧. છંટકાવ કરતી વખતે ખાવું, પીવું, ધૂમ્રપાન કરવું અથવા પાન ચાવવાં નહીં. ૨. ઉત્પાદનનો ઉપયોગ કરતી વખતે આખી બાંયનું શર્ટ, લાંબું પેન્ટ, રાસાયણિક પ્રતિરોધક હાથમોજાં, માસ્ક, ગોગલ્સ અને પગ ઢંકાય એવા શૂઝ પહેરવાં. ૩. પવનની દિશામાં છંટકાવ કરીને, છંટકાવ કરનાર વ્યક્તિ પર છંટકાવના પ્રવાહીની વાછંટ ટાળો. ૪. સ્પ્રેયરના નોઝલને મોં વડે ફૂંકશો નહીં, અવરોધિત નોઝલને પાતળી ડાંખળી અથવા બ્રશથી સાફ કરો. ૫. શરીર પર રસાયણની છાલક ઊડી હોય તો, ખુલ્લા ભાગોને સાબુ અને પુષ્કળ પાણીથી ધોવા. ૬. હાથ અને શરીરના અસુરક્ષિત ભાગોને યોગ્ય રીતે ધોવા. ઉપયોગ કર્યા પછી દૂષિત કપડાંને અલગથી દૂર કરો અને ધોવા.

સાવધાની નિવેદનઃ ૧. લેબલ અને પત્રિકાઓ પર નિર્દિષ્ટ કરેલા હેતુઓ સિવાય અન્ય કોઈપણ હેતુ માટે ઉપયોગ કરવો નહીં. ૨. પત્રિકા પરના નિર્દેશ મુજબ ઉપયોગ કર્યા પછી કન્ટેનરનો નાશ કરો. ૩. મધ એકઠું કરી રહેલી મધમાખીઓ માટે આ પદાર્થ ઝેરી છે, તેથી દિવસના સમયે સક્રિય ચારો સમયગાળા દરમિયાન છંટકાવ કરશો નહીં. **૪. આ ઉત્પાદન જળચર છોડ, માછલી અને અપૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓ માટે ખૂબ જ ઝેરી છે અને આ કારણસર આ પદાર્થનો ઉપયોગ જળચર ઉછેરના સ્થાનમા અને તેની આસપાસ થઈ શકતો નથી.**

વપરાયેલ કન્ટેનરનો નિકાલ, સાધનો અને વધારાની સામગ્રીમાંથી ધોવાઃ ૧. પર્યાવરણીય અને જળ પ્રદૂષણ નિવારવા માટે પેકેજો અથવા વધારાની સામગ્રી અને ધોવાનો સલામત રીતે નિકાલ કરવો તે ઉત્પાદકો, જંતુનાશકોના ફોર્મ્યુલેટર અને ઓપરેટરની ફરજ રહેશે. ૨. વપરાયેલ પેકેજો તેમના પુનઃઉપયોગને રોકવા માટે બહાર છોડવામાં આવશે નહીં. ૩. પેકેજને તોડીને વસવાટથી દૂર દાટી દેવાના રહેશે.

રાસાયણિક રચના :

સામગ્રી		% વ/વ
ઈન્ડોક્સાકાર્બ સ.ઘ.	સક્રિય ઘટક	14.50
નિષ્ક્રિય એનાન્શિઓમર	સક્રિય ઘટક	6.00
આકારહીન સિલિકોન ડાયોક્સાઇડ	સક્રિય ઘટક	7.00
પોલિએથોક્સિલેટેડ પોલિઅરિલ ફિનોલ	સક્રિય ઘટક	9.00
પોલિએથોક્સિલેટેડ પોલિઅરિલ ફિનોલ ફોસ્ફેટ	સક્રિય ઘટક	6.00
નિસ્યંદિત મિથાઈલ સોયેટ	સક્રિય ઘટક	57.50
કુલઃ		**100.00 % વ/વ**

''ખાલી ડબ્બા ફરીથી ઉપયોગ કરવાનું ખતરનાક છે.''

Gujarati

ਇੰਡੋਕਸਾਕਾਰਬ 14.5% ਐਸ.ਸੀ.   ਹਿੰਦ ਔਕਸਾ   (ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ)

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ।

ਇੰਡੋਕਸਾਕਾਰਬ 14.5% ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਘੋਲ ਇਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਜੋ ਕਪਾਹ, ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ, ਟਮਾਟਰ, ਮਿਰਚ, ਅਰਹਰ, ਝੋਨਾ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਲ ਛੇਦਕ ਸੁੰਡੀ ਉੱਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਹੈ ।

ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ :   ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਓ

ਫਸਲ	ਕੀਟ ਦਾ ਆਮ ਨਾਂ	ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਏ. ਆਈ. (ਗ੍ਰਾ.)	ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੂਤਰੀਕਰਣ (ਮਿ.ਲਿ.)	ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਲਿ.)	ਫ਼ਸਲ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਾਲ (ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ)	ਪੁਨਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਵਧੀ (ਘੰਟੇ)
ਕਪਾਹ	ਟਿੰਡੇ ਦੀ ਸੁੰਡੀ	75	500	600-1000	16	
ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ	ਚਮਕੀਲੀ ਪਿੱਠ ਵਾਲਾ ਪਤੰਗਾ	30-40	200-266	400-750	7	
ਟਮਾਟਰ	ਫ਼ਲ ਛੇਦਕ	60-75	400-500	300-600	5	
ਮਿਰਚ	ਫ਼ਲ ਛੇਦਕ	50-60	333-400	300-600	5	24
ਅਰਹਰ	ਫ਼ਲ ਛੇਦਕ ਸਮੂਹ	50-60	333-400	500-1000	15	
ਝੋਨਾ	ਪੀਲਾ ਤਣਾ ਛੇਦਕ, ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ	30-50	200-333	500	37	
ਸੋਇਆਬੀਨ	ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਸੁੰਡੀ	50	333	500	36	
ਛੋਲੇ	ਫ਼ਲ ਛੇਦਕ	60-75	400-500	500	19	

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚੰਗੇ ਅਭਿਆਸ, ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ : ਫ਼ਸਲ ਵੱਲ ਸਿੱਧਾ, ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਉਚਿੱਤ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ । ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਲੋ ਕੋਨ ਨੋਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਜਿਵੇਂ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਰੌਕਿੰਗ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਫੁੱਟ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ : ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ : ਸਵੇਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ । ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛਿੜਕਾਅ ਨਾ ਕਰੋ ।

ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ : ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਫ਼ਸਲ ਅਵਸਥਾ : ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੀਟ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ।

ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ : ਹੋਲੋ ਕੋਨ ਨੋਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮਾਪੀ ਮਾਤਰਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਓ । ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਓ । ਫ਼ਸਲ ਵੱਲ ਸਿੱਧਾ, ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਉਚਿੱਤ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ ।

ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਕਿਸਮ : ਹੋਲੋ ਕੋਨ ਨੋਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਜਿਵੇਂ ਨੈਪਸੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਰੌਕਿੰਗ ਸਪ੍ਰੇਅਰ, ਫੁੱਟ ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਨੋਜ਼ਲ ਕਿਸਮ : ਹੋਲੋ ਕੋਨ ਨੋਜ਼ਲ

ਮਿਕਦਾਰ : ਖੁਰਾਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਣੀ ਵੇਖੋ ।

ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ : ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮਾਪੀ ਮਾਤਰਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਓ । ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਓ ।

ਪੁਨਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਵਧੀ : 24 ਘੰਟੇ

ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾ : ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀਟ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਤੇ 7-10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਫ਼ਸਲ ਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ : ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ : ਸਵੇਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ । ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛਿੜਕਾਅ ਨਾ ਕਰੋ ।

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਰੇਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ : ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਖੁਰਾਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੀਟ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਤੇ 7-10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਪੜਾਅ ਜਿਸਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ :
ਫ਼ਸਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕਾਅ ਨਾ ਕਰੋ।

ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲੱਛਣ: ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਨ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਸਣਾ, ਚਮੜੀ ਤੇ ਖਾਰਸ਼, ਜਲਣ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸੁੰਘਣ ਤੇ ਖੰਘ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵਧੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਨਾੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਸਾਇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਅਨੀਮੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਮੁੱਢਲੇ ਉਪਰਾਰ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ : ਜੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਹੈ : ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਚੁਕੰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ 1 ਜਾਂ 2 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਿਓ । ਬੇਹੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਵੋ । ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਉਲਟੀ ਨਾ ਕਰਵਾਓ । ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੇ : ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ । ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਦਿਓ , ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ । ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ : ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਵਾਲ ਅਤੇ ਨਹੁੰਆ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ । ਜੇ ਦਰਦ, ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਜਲਣ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ । ਸਾਰੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ : ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੌਲੀ–ਹੌਲੀ ਧੋਵੋ । ਜੇ ਦਰਦ, ਜਲਣ, ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ ।

ਜ਼ਹਿਰ ਤੋੜ: ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੋ ।

ਭੰਡਾਰਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ : 1.ਇਸਦਾ ਭੰਡਾਰਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ, ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਖਾਦ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਆਹਾਰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। 2. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਆਹਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ । ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁੱਕੀ, ਠੰਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ । ਜਗ੍ਹਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵੱਡੀ, ਚੌੜੀ ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । 3. ਇਸਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਪੌਦ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਡਿੱਗ ਜਾਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੈਲਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਤੁਰੰਤ ਕਰੋ । ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ ।

ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ : 1. ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਖਾਓ, ਨਾ ਪੀਓ, ਨਾ ਹੀ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰੋ ਨਾ ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਚਬਾਓ । 2. ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਮੇਂ ਲੰਮੀ ਬਾਜੂ ਦੀ ਸ਼ਰਟ, ਲੰਮੀ ਪੈਂਟ, ਰਸਾਇਣ ਰੋਧੀ ਦਸਤਾਨੇ, ਮਾਸਕ, ਚਸ਼ਮੇ ਅਤੇ ਢਕੇ ਹੋਏ ਬੂਟ ਪਹਿਨੋ। 3. ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ, ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਪਰੇਅ ਵਹਾਅ ਤੋਂ ਬਚੋਂ 4. ਸਪਰੇਅ ਨੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਫੂਕ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਬੰਦ ਹੋਈ ਨੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਪਤਲੇ ਤਣੇ ਜਾਂ ਬਰੁਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ । 5. ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਨੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ । 6. ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲਵੋ । ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹਟਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਧੋ ਲਵੋ ।

ਸਾਵਧਾਨੀ ਬਿਆਨ : 1. ਇਸ ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ । 2. ਪਰਚੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਬਿਆ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ । 3. ਉਤਪਾਦ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਲਈ ਜਹਿਰੀਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਛਿੜਕਾਅ ਨਾ ਕਰੋ । **4. ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਜਲ ਜੀਵਾਂ, ਮੱਛੀਆ ਲਈ ਜਹਿਰੀਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਲੇ–ਦੁਆਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।**

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੱਬੇ, ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਧੋਣ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ : 1. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤੇ ਗਏ ਡੱਬੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਵਿਭਿੰਨ ਸਮੱਗਰੀਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਧੋਣ ਅਤੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । 2. ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਛੱਡੋ ਤਾਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣ । 3. ਡੱਬੇ ਤੋੜ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਕੇ ਦਬਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।

ਰਸਾਇਣਿਕ ਮਿਸ਼ਰਣ :

ਘਟਕ		% ਭਾ/ਭਾ
ਇੰਡੋਕਸਾਕਾਰਬ (ਏ. ਆਈ.)	ਸਰਗਰਮ ਘਟਕ	14.50
ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਇਨੈਂਟੀਓਮਰ	ਹੋਰ ਘਟਕ	6.00
ਐਮੋਰਫਸ ਸਿਲਿਕਾੱਨ ਡਾਇਆੱਕਸਾਇਡ	ਹੋਰ ਘਟਕ	7.00
ਪੋਲੀਇਥਾੱਕਸੀਲੇਟੇਡ ਪੋਲੀ ਏਰਾਇਲ ਫਿਨੋਲ	ਹੋਰ ਘਟਕ	9.00
ਪੋਲੀਇਥਾੱਕਸੀਲੇਟੇਡ ਪੋਲੀ ਏਰਾਇਲ ਫਿਨੋਲ ਫਾੱਸਫੇਟ	ਹੋਰ ਘਟਕ	6.00
ਡਿਸਟਿੱਲਡ ਮਿਥਾਇਲ ਸੋਏਟ	ਹੋਰ ਘਟਕ	57.50
ਕੁੱਲ :		100.000 % ਭਾ/ਭਾ

''ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।''

Punjabi

Hind oxa

Indoxacarb 14.5% SC
(Insecticide)

हिन्द ऑक्सा

इन्डोक्साकार्ब १४.५% एस.सी.

(कीटनाशक)

DIRECTION FOR USE

FOR AGRICULTURAL USE
कृषि उपयोग के लिए

Read Leaflet Before Use
इस्तेमाल से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें।

Marketed by:
GUJARAT INSECTICIDES LIMITED
Plot No.805/806,GIDC Estate, Ankleshwar
Dist. Bharuch, Gujarat - 393002.

विक्रेता: **गुजरात इन्सेक्टीसाईडस् लिमिटेड,**
प्लॉट नं.:८०५/८०६, जी.आई.डी.सी.एस्टेट अंकलेश्वर,
जिला– भरूच,गुजरात–३९३००२

Manufactured by:
GHARDA CHEMICALS LIMITED,
Regd.Office:Gharda House,48,Hill Road,Bandra (W),Mumbai-400050.
Factory:Industrial Growth Centre,Phase II, Samba Dist.Samba,Pin 184121,Jammu&Kashmir.

निर्माता: **घरडा केमिकल्स लिमिटेड,**
पंजी. कार्यालय: घरडा हाउस, ४८ हिल रोड बांद्रा (प), मुंबई – ४०० ०५०. फॅक्टरी: इन्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेन्टर, फेज २, साम्बा, जम्मू–कश्मिर – १८४१२१.

For any complaints contact Customer care Executive at Gujarat Insecticides Limited,Plot No. 805/806,GIDC Estate,Ankleshwar,Dist.Bharuch,Gujarat-393002.**Tel.:02646 668200**
Email:customercare@gilgharda.com
website: www.gilgharda.com



J.01.26-01

Actual size: 570 x 400 mm
Date -10.01.2026

ইন্ডোক্সাকার্ব ১৪.৫% এসসি হিন্দোক্সা (কীটনাশক)

ব্যবহারের পূর্বে লিফলেট পড়ে নিন।

ইন্ডোক্সাকার্ব ১৪.৫% সাসপেনশন কনসেন্ট্রেট হল তুলো, টমেটো, লঙ্কা, বাঁধাকপি, কাবলি ছোলা, ধান, সয়াবিন এবং ছোলার ফসলে কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণের জন্য ফোলিয়ার স্প্রে হিসাবে কার্যকরী অন্তর্বাহী একটি স্পর্শজনিত এবং পাকস্থলীজনিত কীটনাশক।

সুপারিশ: **ব্যবহার করার আগে ভাল করে ঝাঁকিয়ে নিন**

ফসল	কীটের সাধারণ নাম	মাত্রা / হেক্টর		জলে দ্রবণীয় (লিটার)	ফসল তোলার পূর্বে বিরতি (দিন)	পুনঃ প্রবেশের সময়কাল (দিন)
		স.উ. (গ্রা.)	ফর্মুলেশন (মিলি)			
তুলো	বোলওয়ার্ম (হেলিকোভার্পা আর্মিগেরা)	75	500	600-1000	16	
বাঁধাকপি	ডায়মন্ড ব্যাক মথ৺ হীরক পৃষ্ঠ মথ (প্লুটেল্লা জাইলোস্টেল্লা)	30-40	200-266	400-750	7	
টমেটো	ফল ছিদ্রকারী পোকা (এইচ. আর্মিগেরা)	60-75	400-500	300-600	5	
লঙ্কা	ফল ছিদ্রকারী পোকা (এইচ. আর্মিগেরা ও স্পোডোপ্টেরা এক্সিগ্ন য়া)	50-60	333-400	300-600	5	24
কাবলি ছোলা	শুঁটি ছিদ্রকারী কমপ্লেক্স (এইচ. আর্মিগেরা, শুঁটি মাছি)	50-60	333-400	500-1000	15	
ধান	মাজরা পোকা (স্কির্পোফাগা ইনসার্টুলাস), পাতা ভাঁজ (সিনাফালোক্রোসিস মেডিনালিস)	30-50	200-333	500	37	
সয়াবীন	টোব্যাকো ক্যাটারপিলার (স্পোডোপ্টেরা লিটুরা)	50	333	500	36	
ছোলা	শুঁটি ছিদ্রকারী পোকা (এইচ. আর্মিগেরা)	60-75	400-500	500	19	

কীটনাশক প্রয়োগ কৌশল সম্পর্কিত উত্তম অনুশীলন, ব্যবহারবিধি: সরাসরি ফসলের দিকে স্প্রে করুন এবং অভিন্ন ও সঠিক কভারেজ নিশ্চিত করুন। উপরোক্ত তালিকাতে নির্দেশিত বিভিন্ন ফসলে লক্ষ্যকৃত কীট-পতঙ্গের মোকাবিলা করার জন্য হলো কোন নজল লাগানো উচ্চ ভল্যুম-এর স্প্রেয়ার যেমন ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার, রকিং স্প্রেয়ার, ফুট স্প্রেয়ার ইত্যাদি ব্যবহার করার পরামর্শ প্রদান করা হয়।

আবহাওয়ার পরিস্থিতি (সাধারণভাবে): বিশেষভাবে সকালে এবং সন্ধ্যার সময় স্প্রে করুন। ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে বা বৃষ্টি হওয়ার পূর্বে প্রয়োগ করবেন না।

মাটি এবং জল (যেখানে প্রযোজ্য): নির্দিষ্ট কোনো মাটি এবং জলের জন্য কোনো শর্ত নির্ধারিত নয়।

প্রয়োগ করার জন্য ফসলের পর্যায়: ফসল বৃদ্ধির যে কোনো পর্যায়ে সুপারিশকৃত ফসলে প্রয়োগ করা যেতে পারে যখন কীট-পতঙ্গের আক্রমণ অর্থনৈতিক ক্ষতির জন্য পরিলক্ষিত হয়।

প্রয়োগ পদ্ধতি: হলো কোন নজল লাগানো উচ্চ মাত্রার স্প্রেয়ার ব্যবহার করার পরামর্শ প্রদান করা হয়। ব্যবহার করার পূর্বে বোতলটিকে ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে নিন। পরিমাপ মত পরিমাণে পণ্যটি নিন এবং তাতে অল্প পরিমাণে জল যোগ করুন, ভালোভাবে মেশান এবং তারপরে অবশিষ্ট পরিমাণ জল যোগ করুন, ব্যবহার করার পূর্বে ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে নিন। সমানভাবে স্প্রে করুন এবং সমস্ত উদ্ভিদে স্প্রেটির যথাযথ কভারেজ সুনিশ্চিত করুন।

সরঞ্জামের ধরন: হলো কোন নজল লাগানো উচ্চ মাত্রার স্প্রেয়ার যেমন ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার, রকিং স্প্রেয়ার, ফুট স্প্রেয়ার ইত্যাদি ব্যবহার করা উচিৎ।

নজল-এর ধরন: হলো কোন নজল

মাত্রা: মাত্রার বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে উপরোক্ত তালিকাটি পড়ুন।

মিশ্রণ প্রস্তুত করার নির্দেশ: পরিমাপ মত পরিমাণে পণ্যটি নিন এবং তাতে অল্প পরিমাণে জল যোগ করুন, ভালোভাবে মেশান এবং তারপরে অবশিষ্ট পরিমাণ জল যোগ করুন, ব্যবহার করার পূর্বে ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে নিন।

পুনঃপ্রবেশের সময়কাল: ২৪ ঘন্টা

প্রয়োগের পদ্ধতি এবং সময়কাল: ক্ষেতে কীট-পতঙ্গের উপদ্রব লক্ষ্য করলে ৭-১০ দিনের ব্যবধানে উল্লিখিত ফসলগুলিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

প্রয়োগের সময়: বিশেষ করে সকালে এবং সন্ধ্যার সময় স্প্রে করুন। ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে বা বৃষ্টি হওয়ার পূর্বে প্রয়োগ করবেন না।

সর্বাধিক সংখ্যক স্প্রে পুনরাবৃত্তি: উপরোক্ত তালিকাতে উল্লিখিত মাত্রায় কীট-পতঙ্গের উপদ্রব লক্ষ্য করলে ৭-১০ দিনের ব্যবধানে একবার থেকে দুইবার স্প্রে করে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ফসলের যে পর্যায়ে কোনো ফসলে কীটনাশক প্রয়োগ করা উচিত নয়: ফসলের যে পর্যায়গুলি নির্দেশিত কেবলমাত্র সেই পর্যায়েই প্রয়োগ করুন। অন্য কোনো পর্যায়ে প্রয়োগ করবেন না।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ: জল পড়া সহ চোখে হালকা জ্বালা করা, ব্যথা হওয়া বা ঝাপসা দৃষ্টি, ত্বকে চুলকানি, জ্বালা করা, লালচে ভাব, ফোলাভাব বা র‍্যাশ, বাস্পে শ্বাস নেওয়ার কারণে কাশি এবং স্বস্তি সহ শ্বাসনালীর উপরিঅংশে জ্বালা করতে পারে। পশুদের উপরে পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে, ব্যাপক মাত্রায় নিউরোটক্সিসিটি-এর লক্ষণ লক্ষ্য করা যেতে পারে। দীর্ঘসময় ধরে বেশিমাত্রার সংস্পর্শে থাকার ফলে শারীরিক ওজন হ্রাস এবং হালকা, বিপরীতমুখী অ্যানিমিয়া হতে পারে বলে মনে করা হয়।

প্রাথমিক চিকিৎসা: যদি গিলে ফেলে: ব্যক্তিটি সচেতন এবং সজাগ থাকলে, জল দিয়ে ভালোভাবে কুলকুচি করে মুখ ধোয়ান এবং পান করার জন্য ১ বা ২ গ্লাস জল দিন। অচেতন ব্যক্তির মুখে কিছু দেবেন না। চিকিৎসককে ডাকুন। উপস্থিত চিকিৎসক নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বমি করাবেন না। যদি শ্বাস নিয়ে নেয়: ব্যক্তিটিকে বিশুদ্ধ বাতাসে নিয়ে যান এবং শরীরের তাপমাত্রার দিকে খেয়াল রাখুন। যদি ব্যক্তিটি শ্বাস নিতে না পারে বা শ্বাস নিতে অসুবিধা হয় তাহলে কৃত্রিমভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস দেওয়ার ব্যবস্থা করুন, বিশেষ করে মাউথ টু মাউথ শ্বাস দেওয়ার মাধ্যমে। একজন চিকিৎসকরে পরামর্শ নিন। যদি ত্বকের সংস্পর্শে আসে: চল এবং নখ সহ শরীরের দূষিত অংশগুলিকে সাবান এবং জল দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। যদি তারপরেও ব্যথা, লালচেভাব বা অস্বস্তি অনুভূত হয়, তাহলে একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। সমস্ত দূষিত পোশাক আলাদা করে রাখা উচিত এবং ব্যবহার করার পূর্বে আলাদাভাবে সাবান এবং জল দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নেওয়া উচিত। যদি চোখে চলে যায়: কম করে ১৫ মিনিট সময় ধরে প্রচুর পরিমাণে জল দিয়ে ভালোভাবে চোখ ধুয়ে নিন। যদি তারপরেও ব্যথা, অস্বস্তি, লালচেভাব বা ফটোফোবিয়া অব্যাহত থাকে, তাহলে একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

প্রতিষেধক: নির্দিষ্ট কোনো প্রতিষেধক জানা নেই। লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করুন।

ফাইটোটক্সিসিটি: নির্দেশিত মাত্রায় ব্যবহার করলে ফাইটোটক্সিক নয়।

সংরক্ষণের শর্তাবলী: ১. কীটনাশকটিকে এইরকমভাবে সংরক্ষণ এবং পরিবহন করা উচিত যাতে এটির দ্বারা কোনো খাদ্যদ্রব্য এবং পশুখাদ্য দূষিত না হয়। ২. একটি শীতল, শুষ্ক, উত্তমরূপে বাতায়িত, পর্যাপ্ত মাত্রার সুনির্মিত ঘরে এবং এটির আসল প্যাকেজে খাদ্যসমাগ্রী এবং পশুখাদ্য থেকে দূরে সংরক্ষণ করুন। ৩. পরিবহন বা সংরক্ষণ করার সময় যদি লিকেজ হয় বা পড়ে যায় তাহলে মাটি এবং জলের বিষক্রিয়া এবং দূষণ রোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। শিশুদের থেকে দূরে রাখুন।

সুরক্ষা সংক্রান্ত সতর্কতা: ১. স্প্রে করার সময় কোনো কিছু খাবেন না, পান করবেন না বা চাবাবেন না। ২. পণ্যটি ব্যবহার করার সময় ফুলহাতা জামা, ফুলপ্যান্ট, রাসায়নিক প্রতিরোধক দস্তানা বা গ্লাভস্, মাস্ক, গগলস্ এবং বুট জুতো পরুন। ৩. স্প্রেকারী ব্যক্তি উপর একটি অকার্যকর স্প্রে করে বাতাসের অভিমুখ দেখে নিন। ৪. নজলে মুখ দিয়ে ফুঁ দেবেন না, সরু একটি কাঠি বা ব্রাশ দিয়ে নজলের অবরুদ্ধ সামনের অংশটি পরিষ্কার করে নিন। ৫. শরীরের কোনো অংশে ছিঁটে লাগার ক্ষেত্রে, উন্মুক্ত অংশগুলি সাবার এবং প্রচুর পরিমাণে জল দিয়ে ধুয়ে নিন। ৬. হাত এবং শরীরের উন্মুক্ত অংশগুলিকে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। ব্যবহার করার পরে দূষিত পোশাক খুলে ফেলুন এবং আলাদা করে রাখুন।

সতর্কতামূলক বিবৃতি: ১. লেবেল এবং লিফলেটগুলিতে নির্দেশ ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা উচিত নয়। ২. ব্যবহারের পরে লিফলেটে নির্দেশ অনুযায়ী কৌটোটিকে বিনষ্ট করে ফেলুন। ৩. পণ্যটি মৌমাছির পক্ষে বিষাক্ত, তাই দিনের যে সময়টিতে মৌমাছিরা সক্রিয় থাকে সেই সময় স্প্রে করবেন না। ৪. পণ্যটি জলজ উদ্ভিদ, মাছ এবং অমেরুদন্ডী প্রাণীর পক্ষে অত্যন্ত বিষাক্ত, সুতরাং জলজ চাষের ক্ষেত্র এবং তার আশেপাশে ব্যবহার করবেন না।

ব্যবহৃত পাত্র, সরঞ্জাম ধোয়ানি জল এবং উদ্বৃত্ত উপাদান বিনষ্টকরণ: ১. পরিবেশ বা জল দূষণ রোধ করার জন্য প্যাকেজ বা উদ্বৃত্ত উপাদান এবং ধোয়ানি জল নিরাপদে নিষ্পত্তি করা কীটনাশক প্রস্তুতকারক এবং ব্যবহারকারীর দায়িত্ব হবে। ২. পুনর্ব্যবহার প্রতিরোধ করার জন্য ব্যবহৃত প্যাকেজগুলিকে বাইরে যত্রতত্র ফেলে রাখবেন না। ৩. প্যাকেজগুলিকে লোকালয় থেকে দূরে ভেঙ্গে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে।

রাসায়নিক গঠন:

উপাদান		% ও/ও
ইন্ডোক্সাকার্ব স.উ.	সক্রিয় উপাদান	১৪.৫০
নিষ্ক্রিয় এন্যান্টিওমার	অন্যান্য উপাদান	৬.০০
অ্যামোরফাস সিলিকন ডায়োক্সাইড	অন্যান্য উপাদান	৭.০০
পলিইথোক্সিলেটেড পলিঅ্যারাইল ফেনল	অন্যান্য উপাদান	৯.০০
পলিইথোক্সিলেটেড পলিঅ্যারাইল ফেনল ফসফেট	অন্যান্য উপাদান	৬.০০
ডিস্টিল্ড মিথাইল সোয়েট	অন্যান্য উপাদান	৫৭.৫০
মোট:		১০০.০০% ও/ও

"খালি পাত্র ব্যবহার করা বিপজ্জনক"

Bengali

ಇಂಡಾಕ್ಸಕಾರ್ಬ್ 14.5% ಎಸ್‌ಸಿ ಹಿಂದ್ ಆಕ್ಸ (ಕೀಟನಾಶಕ)

ಬಳಸುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿರಿ.

ಇಂಡಾಕ್ಸಕಾರ್ಬ್ 14.5% ಎಸ್‌ಸಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣವು ಒಂದು ವಿಶಾಲ ರೋಹಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕೋಸು, ತೊಗರಿಕಾಳು, ಭತ್ತ, ಸೊಯಾಬೀನ್ ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಿಂಪಡಣೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಉದರ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದೆ.

ಶಿಫಾರಸು: **ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲುಗಾಡಿಸಿ**

ಬೆಳೆ	ಕೀಟದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಡೊಸೇಜ್ / ಹೆ		ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವಿಕೆ (ಲೀಟರ್)	ಕೊಯ್ಲು ಪೂರ್ವ ಮಧ್ಯಂತರ (ದಿನಗಳು)	ಮರುಪ್ರವೇಶ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)
		ಎ.ಐ (ಗ್ರಾಂ)	ಸೂತ್ರೀಕರಣ (ಮಿಲೀ)			
ಹತ್ತಿ	ಕಾಯಿಕೊರಕ (ಹೆಲಿಕೊವರ್ಪ ಆರ್ಮಿಗೆರಾ)	75	500	600-1000	16	
ಕೋಸು	ಡೈಮಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೊಥ್ (ಪ್ಲುಟೆಲಾ ಕ್ಸೈಲೊಸ್ಟೆಲಾ)	30-40	200-266	400-750	7	
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ	ಹಣ್ಣುಕೊರಕ (ಹೆಚ್.ಆರ್ಮಿಗೆರಾ)	60-75	4005-00	300-600	5	
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ	ಹಣ್ಣುಕೊರಕ (ಹೆಚ್.ಆರ್ಮಿಗೆರಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪೊಡೊಪ್ಟೆರಾ ಎಕ್ಸಿಗುವಾ)	50-60	333-400	300-600	5	24
ತೊಗರಿಕಾಳು	ಪಾಡ್ ಬೊರರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ (ಹೆಚ್.ಆರ್ಮಿಗೆರಾ, ಪಾಡ್ ಫ್ಲೈ)	50-60	333-400	500-1000	15	
ಭತ್ತ	ಹಳದಿ ಕಾಂಡ ಕೊರಕ (ಸಿರ್ಪೊಫೊಗಾ ಇನ್‌ಸೆರ್ಟುಲಾಸ್) ಎಲೆಸುತ್ತುಹುಳು (ನ್ಯಾಫಾಲೊಕ್ರೊಸಿಸ್ ಮೆಡಿನಾಲಿಸ್)	30-50	200-333	500	37	
ಸೊಯಾಬೀನ್	ತಂಬಾಕು ಕಂಬಳಿಹುಳು (ಸ್ಪೊಡೊಪ್ಟೆರಾ ಲಿಟ್ಯುರಾ)	50	333	500	36	
ಕಡಲೆಕಾಳು	ಕಾಯಿಕೊರಕ (ಹೆಚ್.ಆರ್ಮಿಗೆರಾ)	60-75	400-500	500	19	

ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತಮ ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನ: ಬೆಳೆಗೆ ನೇರವಾದ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕವರೇಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದಂತೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೀಟಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಲೊಕೋನ್ ನಾಝಲ್‌ನಿಂದ ಫಿಟ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಫೂಟ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್‌ನಂತಹ ಹೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ): ಬೆಳಗಿನ ಮತ್ತು ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ. ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಳೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಡಿ.

ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು (ಅನ್ವಯವಾಗುವಲ್ಲಿ): ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಬೆಳೆಯ ಹಂತ: ಕೀಟದ ಪ್ರಸಂಗವು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದೆಂದು ಗಮನಿಸಿರುವಾಗ ಬೆಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು.

ಅನ್ವಯಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು: ಹಾಲೊ ಕೋನ್ ನಾಝಲ್ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಹೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಳಕೆಗೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲುಗಾಡಿಸಿ. ...

... ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಬಳಸಬಾರದು. 2. ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದಂತೆ ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ. 3. ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಜೇನುಹುಳುಗಳಿಗೆ, ಮೀನುಗಳಿ ಮತ್ತು ಅಕಶೇರುಕಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಜಲಚರಗಳ ಸಾಕಾಣೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು.

ಬಳಸಿದ ಡಬ್ಬಿಗಳು, ಯಂತ್ರದಿಂದ ತೊಳೆದ ನೀರು ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಸಾಮಗ್ರಿಯ ವಿಲೇವಾರಿ: 1. ಪರಿಸರಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳು, ಅಥವಾ ಪೂರಕ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಮತ್ತು ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಈ ಉತ್ಪನ್ನದ ಉತ್ಪಾದಕರ, ಫಾರ್ಮುಲೇಟರ್‌ಗಳ ಮತ್ತು ಆಪರೇಟರ್‌ಗಳ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2.ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮರುಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೊರಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಎಸೆದುಬಿಡಬಾರದು. 3.ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಜನವಸತಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೂತುಹಾಕಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಒಳಾಂಶ		%ಡಬ್ಲು/ಡಬ್ಲು
ಇಂಡಾಕ್ಸಕಾರ್ಬ್ ಎ.ಐ	ಸಕ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥ	14.50
ಸಕ್ರಿಯವಲ್ಲದ ಎನಾನ್ಷಮರ್	ಇತರ ಪದಾರ್ಥ	6.00
ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್	ಇತರ ಪದಾರ್ಥ	7.00
ಪಾಲಿಈಥೈಲೇಟೆಡ್ ಪಾಲಿಅರೈಲ್ ಫೆನಾಲ್	ಇತರ ಪದಾರ್ಥ	9.00
ಪಾಲಿಈಥೈಲೇಟೆಡ್ ಪಾಲಿಅರೈಲ್ ಫೆನಾಲ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್	ಇತರ ಪದಾರ್ಥ	6.00
ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ಮಿಥೈಲ್ ಸೊಯೆಟ್	ಇತರ ಪದಾರ್ಥ	57.50
ಒಟ್ಟು		100.00% ಡಬ್ಲು/ಡಬ್ಲು

''ಬರಿದಾದ ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳನ್ನು ಪುನ: ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.''

Kannada

ఇండోక్సాకార్బ్ 14.5% ఎస్‌సి హింద్ ఆక్సా (కీటకనాశిని)

ఉపయోగించడానికి ముందు కరపత్రం చదవండి.

ఇండోక్సాకార్బ్ 14.5% సస్పెన్షన్ కాన్‌సన్‌ట్రేట్ అనేది విస్తృత పరిధి గల తాకుడు మరియు ఉదర చర్యపై ఆధారపడిన కీటకనాశిని. ప్రత్తి, టమాటా, మిరప, క్యాబేజి, కంది, వరి, సోయాబీన్ మరియు శనగ పంటల్లో కీటకాలను నియంత్రించేందుకు ఆకులపై పిచికారిగా ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుంది.

ఉపయోగించుట: **వినియోగానికి ముందు బాగా షేక్ చేయండి**

పంట	కీటకం మామూలు పేరు	మోతాదు/హె		కలపవలసిన నీళ్ళు (లీటర్లు)	పంట కోత ముందరి విరామం (రోజులు)	పునఃప్రవేశ వ్యవధి (రోజులు)
		ఎ.ఐ. (గ్రా)	ఫార్ములేషన్ (మి.లీ)			
ప్రత్తి	కాయతొలుచు పురుగు (హెలికోవెర్పా ఆర్మిజెరా)	75	500	600-1000	16	
క్యాబేజ్	డైమండ్ బ్యాక్ మోత్ (ఫ్లుటెల్లా జైలోస్టెల్లా)	30-40	200-266	400-750	7	
టమాటా	కాయ తొలుచు పురుగు (హెచ్. ఆర్మిజెరా)	60-75	400-500	300-600	5	
మిరప	కాయ తొలుచు పురుగు (హెచ్. ఆర్మిజెరా మరియు స్పోడోప్టెరా ఎక్సిగువా)	50-60	333-400	300-600	5	24
కంది	కాయ తొలుచు పురుగు (హెచ్. ఆర్మిజెరా, కాయకు సోకే ఈగ)	50-60	333-400	500-1000	15	
వరి	పసుపుపచ్చని కాండం తొలుచు పురుగు (సిర్పోఫాగా ఇన్‌సెర్టులాస్), ఆకుముడత (సైనాఫాలోక్రోసిస్ మెడినాలిస్)	30-50	200-333	500	37	
సోయాబీన్	పొగాకు లద్దె పురుగు (స్పోడోప్టెరా లిటురా)	50	333	500	36	
శనగ	కాయ తొలుచు పురుగు (హెచ్. ఆర్మిజెరా)	60-75	400-500	500	19	

పురుగుమందుల వినియోగ టెక్నిక్‌లకు సంబంధించిన మంచి పద్ధతులు, ఉపయోగించేందుకు నిర్దేశనం: పంటపై నేరుగా పిచికారి చేయకండి మరియు కవరేజి సమంగా మరియు తగువిధంగా ఉండేలా చూడండి. పైన పట్టికలో సూచించినట్లుగా విభిన్న పంటల్లో లక్షిత కీటకాలపై, హాలో కోన్ నాజిల్ బిగించబడిన న్యాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, రాకింగ్ స్ప్రేయర్, ఫుట్ స్ప్రేయర్ లాంటి హై వాల్యూమ్ స్ప్రేయర్‌ని ఉపయోగించవలసిందిగా సిఫారసు చేయడమైనది.

వాతావరణ పరిస్థితి (సాధారణంగా): ఉదయం మరియు సాయంత్రం వేళల్లో పిచికారి చేసేందుకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వండి. గాలి వీచే రోజున లేదా వర్షం కురవడానికి ముందు పిచికారి చేయకండి.

...

హెచ్చరిక: 1. లేబుల్ మరియు కరపత్రంలో తెలియజేసిన వాటికి కాకుండా ఇతర పంటలు వేటికీ ఉపయోగించకూడదు. 2. ఉపయోగించిన తరువాత కరపత్రంలో నిర్దేశించినట్లుగా డబ్బాను నిర్వీర్యం చేయండి. 3. ఈ ఉత్పాదన తేనెటీగలకు విషపూరితం కాబట్టి పగటు అవి చురుకుగా తిరిగే సమయంలో పిచికారి చేయకండి. 4. **ఈ ఉత్పాదన చేపలకు మరియు రొయ్యలకు అత్యంత విషపూరితమైనది కాబట్టి ఆక్వాకల్చర్‌కి దగ్గరలో ఉపయోగించకూడదు.**

ఉపయోగించిన డబ్బాలను, పరికరాలను కడిగిన నీటిని మరియు మిగులు ఉత్పాదనని నిర్వీర్యం చేయటం: 1. ప్యాకేజీలను లేదా మిగులు ఉత్పాదనని మరియు డబ్బాలను కడిగిన నీటిని పర్యావరణం లేదా నీటి కాలుష్యాన్ని నిరోధించే విధంగా సురక్షితమైన పద్ధతిలో విసర్జించవలసిన బాధ్యత కీటకనాశినిల తయారీదారులది, రూపకర్తలది మరియు ఆపరేటర్లది. 2. ఉపయోగించిన ప్యాకేజీలను మళ్ళీ ఉపయోగించకుండా నిరోధించాలంటే ఆరుబయట వదిలేయకూడదు. 3. ప్యాకేజీలను పగులగొట్టి నివాస ప్రాంతాలకు దూరంగా నేలలో పూడ్చిపెట్టాలి.

రసాయనిక మిశ్రమం:

పదార్థం		% బ/బ
ఇండోక్సాకార్బ్ ఎ.ఐ.	క్రియాశీల పదార్థం	14.50
క్రియారహిత ఎనాంటియోమర్	వేరొక పదార్థం	6.00
అమోర్ఫస్ సిలికాన్ డయాక్సైడ్	వేరొక పదార్థం	7.00
పాలిఎథోక్సిలేటెడ్ పాలిఅరైల్ ఫినాల్	వేరొక పదార్థం	9.00
పాలిఎథోక్సిలేటెడ్ పాలిఅరైల్ ఫినాల్ ఫాస్ఫేట్	వేరొక పదార్థం	6.00
డిస్టిల్డ్ మిథైల్ సోయేట్	వేరొక పదార్థం	57.50
మొత్తం:		100.00% బ/బ

''ఖాళీ డబ్బాలని తిరిగి ఉపయోగించడం ప్రమాదం''

Telugu

ஹிண்டாக்ஸா

இண்டோக்ஸாகார்ப் 14.5% எஸ்சி (பூச்சிக்கொல்லி)

உபயோகிப்பதற்கு முன்பு கீழ் கண்டதை படிக்கவும்

இண்டோக்ஸாகார்ப் 14.5% சஸ்பென்ஷன் கான்செண்ட்ரேட் என்பது பருத்தி, தக்காளி, மிளகாய், முட்டைக்கோஸ், புறாப்பழம், அரிசி, சோயாபீன் மற்றும் கொண்டைக்கடலை ஆகியவற்றில் உள்ள பூச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்த இலைவழித் தெளிப்பாகப் பயன்படும் ஒரு பரந்த அளவிலான தொடர்பு மற்றும் வயிற்றுப் பூச்சிக்கொல்லி ஆகும்.

பரிந்துரைப்பு: **பயன்படுத்துவதற்கு முன் நன்றாக குலுக்கவும்**

பயிர்	பூச்சியின் பொதுவான பெயர்	மருந்தளவு/ஹெக்		தண்ணீரில் நீர்க்கச் செய்வது (லிட்டர்)	அறுவடைக்கு முந்தைய இடை வெளி (நாட்கள்)	மீண்டும்-செய்வதற்கான காலம் (நாட்கள்)
		ஏ.ஐ. (கி)	ஃபார்மு லேஷன் (மிலி)			
பருத்தி	பருத்திகாய்ப்புழு (ஹெலிகோவர்பா ஆர்மிகெரா)	75	500	600-1000	16	
முட்டை - கோஸ்	வைர முதுகுஅந்து பூச்சி (புளூட்டெல்லா சைலோஸ்டெல்லா)	30-40	200-266	400-750	7	
தக்காளி	பழ துளைப்பான் புழு (ஹெச். ஆர்மிகெரா)	60-75	400-500	300-600	5	
மிளகாய்	பழ துளைப்பான் புழு (ஹெச். ஆர்மிகெரா மற்றும் ஸ்போடோப்டெரா எக்ஸிகுவா)	50-60	333-400	300-600	5	24
தட்டான் பயிறு	காய் துளைப்பான் காம்ப்ளக்ஸ் (ஹெச். ஆர்மிகெரா, போட் ஃப்ளை)	50-60	333-400	500-1000	15	
அரிசி	மஞ்சள் தண்டுதுளைப்பான் (ஸ்கிர்போபேஜ் இன்சொர்டுலாஸ்), லீஃப் ஃபோல்டர் (கிராபலெக்ரோசிஸ் மெடினலிஸ்)	30-50	200-333	500	37	
சோயாபீன்	வெட்டுப்புழு (ஸ்போடோப்டெரா லிட்யூரா)	50	333	500	36	
கொண்ட-டக்கடலை	புள்ளி காய் துளைப்பான் (ஹெச். ஆர்மிகெரா)	60-75	400-500	500	19	

பூச்சிக்கொல்லி பயன்பாட்டு நுட்பங்கள் தொடர்பான நல்ல நடைமுறைகள் பயன்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகள்: பயிரை நோக்கி நேரடியாக தெளிக்கவும், சீரான மற்றும் சரியான பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும். மேலே உள்ள அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி வெவ்வேறு பயிர்களில் இலக்கு பூச்சிகளுக்கு எதிராக ஆழமான குழி இள்ள முனை பொருத்தப்பட்ட நாப்சாக் ஸ்ப்ரேயர், ராக்கிங் ஸ்ப்ரேயர், ஃபுட் ஸ்ப்ரேயர் போன்ற அதிக அளவு ஸ்ப்ரேயரை பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

தட்பவெப்பநிலை (பொதுவாக): காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் தெளிப்பது நல்லது. காற்று வீசும் நாளில் அல்லது மழைக்கு முன்பு பயன்படுத்தக் கூடாது.

மண் மற்றும் தண்ணீர் (பொருந்தக்கூடிய இடங்களில்): பிரத்யேக மண் மற்றும் தண்ணீர் நிலைகள் எதுவும் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை.

பயன்படுத்துவதற்கான பயிர் நிலை: பொருளாதார இழப்பை ஏற்படுத்தும் பூச்சிகளின் தாக்கம் காணப்பட்டால், பயிர் வளர்ச்சியின் எந்த நிலையிலும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட பயிரில் பயன்படுத்தப்படலாம்.

...

இந்த மருந்து தேனீக்களுக்கு நச்சுத்தன்மை வாய்ந்தது, ஆகவே நாள் முழுவதும் உணவு தேடும் காலத்தில் தெளிக்க வேண்டாம். **4. மருந்து நீர்வாழ் தாவரங்கள், மீன் மற்றும் முதுகெலும்பில்லாத உயிரினங்களுக்கு மிகவும் நச்சுத்தன்மையுடையது மற்றும் மீன் வளர்ப்பிலும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் பயன்படுத்தப்படக்கூடாது.**

பயன்படுத்திய டப்பாவை அப்புறப்படுத்தல், உபகரணங்கள் மற்றும் உபரிப் பொருட்களை கழுவுதல்: 1. சுற்றுச்சூழல் மற்றும் தண்ணீர் மாசுபடுவதை தடுக்க ஒரு பாதுகாப்பான முறையில் பேக்கேஜ்கள் அல்லது உபரிப் பொருட்கள் மற்றும் கழுவிய நீரை அப்புறப்படுத்துவது தயாரிப்பாளர்கள், உயிரியில் பூச்சிக்கொல்லியின் ஃபார்முலேட்டர்கள் மற்றும் இயக்குபவரின் கடமையாகும். 2. பயன்படுத்திய பேக்கேஜ்களை மீண்டும் பயன்படுத்தும் வகையில் வெளியே விட்டு வைக்கக் கூடாது. 3. பேக்கேஜ்களை உடைத்து குடியிருப்புப் பகுதியிலிருந்து தொலைவில் புதைக்க வேண்டும்.

வேதியியல் உருவாக்கம்:

உட்பொருள்		% டபிள்யூடபிள்யூ
இண்டோக்ஸாகார்ப் ஏ.ஐ.	செயலாற்றல் உள்ள உட்பொருள்	14.50
செயலற்ற என்ன்டியோமர்	இதர உட்பொருள்	6.00
அமர்பாஸ் சிலிக்கான் டை ஆக்சைடு	இதர உட்பொருள்	7.00
பாலிக்டாக்சிலேட்டட் பாலியரில் பீனால்	இதர உட்பொருள்	9.00
பாலித்தோக்சிலேட்டட் பாலியரில் பீனால் பாஸ்பேட்	இதர உட்பொருள்	6.00
டிஸ்டில்டு மெத்தில் சோயேட்	இதர உட்பொருள்	57.50
மொத்தம்		100.00% டபிள்யூடபிள்யூ

''வெற்று கொள்கலனை பயன்படுத்துவது அபாயகரமனாது''

Tamil

ഹിന്ദോക്സ

ഇൻഡോക്സാകാർബ് 14.5 % എസ്സി (കീടനാശിനി)

ഇൻഡോക്സാകാർബ് 14.5 % സസ്പെൻഷൻ കോൺസൻട്രേറ്റ് വിശാല പ്രവർത്തന മണ്ഡലമുള്ള സമ്പർക്കത്താലും ഉദരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കീടനാശിനിയാണ്. പരുത്തി, തക്കാളി, മുളക്, ക്യാബേജ്, കടല, നെല്ല്, സോയാബീൻ, തുവര പയർ എന്നിവയിലെ കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഇലകളിൽ തളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ശുപാർശകൾ: **ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നന്നായി കുലുക്കുക**

വിളകൾ	കീടങ്ങളുടെ സാധാരണ പേര്	ഡോസേജ്/ ഹെക്ടർ		വെള്ളത്തിൽ നേർപ്പിക്കൽ (ലിറ്റർ)	വിളവെടുപ്പിനു മുമ്പുള്ള ഇടവേള (ദിവസം)	പുനപ്രവേശ കാലയളവ് (ദിവസം)
		എ.ഐ (ഗ്രാം)	ഫോർമുലേഷൻ (മില്ലി)			
പരുത്തി	ബോൾ വേം (ഹെലികോവെർപ ആർമിഗേര)	75	500	600-1000	16	
ക്യാബേജ്	ഡയമണ്ട് ബാക്ക് മോത്ത് (പ്ലൂടെല്ല സൈലോസ്റ്റെല്ല)	30-40	200-266	400-750	7	
തക്കാളി	കായ തുരപ്പൻ (എച്ച്. അർമിഗേര)	60-75	400-500	300-600	5	
മുളക്	കായ തുരപ്പൻ (എച്ച്. അർമിഗേര, സ്പോഡോപ്ടേര എക്സിഗുവ)	50-60	333-400	300-600	5	24
തുവരപയർ	പോളതുരപ്പൻ (എച്ച്. ആർമിഗേര, പോള ഈച്ച)	50-60	333-400	500-1000	15	
നെല്ല്	മഞ്ഞ തണ്ടു തുരപ്പൻ (സ്കിർപോഫേഗ ഇൻസെർടുലസ്), ഇലചുരുട്ടി, ക്ലാഫലോക്രോസിസ് മെഡിനാലിസ്)	30-50	200-333	500	37	
സോയാബീൻ	പുകയില പുഴു (സ്പോഡോപ്ടേര ലിട്യൂര)	50	333	500	36	
കടല	പ്ള തുരപ്പൻ (എച്ച്. അർമിഗേര)	60-75	400-500	500	19	

കീടനാശിനി പ്രയോഗ രീതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നല്ല രീതികൾ, ഉപയോഗ നിർദ്ദേശം: വിളകൾക്ക് നേരെ നേരിട്ട് തളിക്കുകയും ഏകീകൃതവും ശരിയായതുമായ കവറേജ് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക. മേൽപ്പറഞ്ഞ പട്ടികയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ വിവിധ വിളകളിൽ ലക്ഷ്യ കീടനാശിനികൾക്കെതിരെ ഹോളോ കോൺ നോസിൽ ഘടിപ്പിച്ച നാപ് സാക്ക് സ്പ്രേയർ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടറൈസ്ഡ് നാപ്സാക്ക് സ്പ്രേയർ ഉപയോഗിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

കാലാവസ്ഥ (പൊതുവിൽ): രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും തളിക്കുക. കാറ്റുള്ള ദിവസത്തിലോ മഴയ്ക്ക് മുമ്പോ പ്രയോഗിക്കരുത്.

മണ്ണും വെള്ളവും (ബാധകമാകുന്നിടത്ത്): പ്രത്യേക മണ്ണ് – ജല സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല.

പ്രയോഗത്തിനുള്ള വിള ഘട്ടം: പ്രാണികളുടെ ആക്രമണം സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഘട്ടമായി നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ വിള വളർച്ചയുടെ ഏത് ഘട്ടത്തിലും ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന വിളകളിൽ പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

പ്രയോഗ വിദ്യകൾ: ഹോളോ കോൺ നോസിൽ ഘടിപ്പിച്ച നാപ്സാക്ക് സ്പ്രേയർ ...

... നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം കണ്ടെയ്നർ നശിപ്പിക്കുക. 3. ഉൽപന്നം തേനീച്ചകൾക്ക് വിഷാംശം ഉള്ളതിനാൽ തേനീച്ചകൾ സജീവമായി തേൻ തേടുന്ന സമയങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കരുത്. 4. **ഉൽപ്പന്നം മത്സ്യത്തിനും ജലജീവികൾക്കും വളരെ വിഷാംശം ഉള്ളതിനാൽ, മത്സ്യകൃഷിക്ക് സമീപം അതിന്റെ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കാം.**

ഉപയോഗിച്ച കണ്ടെയ്നർ , ഉപകരണം കഴുകി വരുന്ന വെള്ളം , അധിക പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യൽ: 1. പാരിസ്ഥിതിക, ജല മലിനീകരണം തടയുന്നതിനായി കഴുകി വരുന്ന വെള്ളവും മിച്ചമുള്ള വസ്തുക്കളും സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടത് കീടനാശിനിയുടെ നിർമ്മാതാവിന്റെയും ഫോർമുലേറ്റർമാരുടെയും ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെയും കടമയാണ്. 2. ഉപയോഗിച്ച പാക്കേജുകൾ അവയുടെ പുനരുപയോഗം തടയുന്നതിന് പുറത്ത് ഉപേക്ഷിക്കരുത്. 3. പാക്കേജ് തകർത്ത് വാസസ്ഥലത്ത് നിന്ന് അകലെ കുഴിച്ചിടേണ്ടതാണ്.

രാസഘടന:

ഉള്ളടക്കം		% ഡബ്ല്യൂ/ഡബ്ല്യൂ
ഇൻഡോക്സാകാർബ് എ.ഐ	സജീവ ഘടകങ്ങൾ	14.50
സജീവമല്ലാത്ത എനാന്റിയോമർ	മറ്റു ഘടകങ്ങൾ	6.00
അമോർഫസ് സിലിക്കോൺ ഡയോക്സൈഡ്	മറ്റു ഘടകങ്ങൾ	7.00
പോളി എതോക്സിലേറ്റഡ് പോള്യാരിൽ ഫിനോൾ	മറ്റു ഘടകങ്ങൾ	9.00
പോളി എതോക്സിലേറ്റഡ് പോള്യാരിൽ ഫിനോൾ ഫോസ്ഫേറ്റ്	മറ്റു ഘടകങ്ങൾ	6.00
ഡിസ്റ്റിൽഡ് മീഥൈൽ സോയതെ	മറ്റു ഘടകങ്ങൾ	57.50
മൊത്തം:		100.00%ഡബ്ല്യൂ/ഡബ്ല്യൂ

"ഒഴിഞ്ഞ കണ്ടെയ്നറുകൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആപത്കരമാണ്"

Malayalam

انڈوکساکارب ۱۴.۵٪ ایس سی ہند آکسا (حشرات کش)

استعمال سے پہلے کتابچہ پڑھیں۔

انڈوکساکارب ۱۴.۵٪ گاڑھے سیال والا کشید کردہ دوا ہے، یہ ایک کثیر جہتی نظام انہظام پر اثر انداز اور لمسی حشرات کش دوا ہے جو پتیوں کے چھڑکاؤ کے ذریعے کپاس، ٹماٹر، مرچ، بند گوبھی، ارہر کی دال، دھان، سویابین اور چنے کی فصل میں حشرات پر قابو فراہم کرنے میں نہایت موثر ہے۔

سفارشات: **استعمال سے پہلے اچھی طرح ہلائیں**

فصل	حشرات کا عام نام	مقدار/ہیکٹر		پانی میں محلول (لیٹر)	کٹائی سے قبل وقفہ (دن)	دوبارہ چھڑکاؤ (دن)
		اے آئی (گرام)	فارمولیشن (ملی لیٹر)			
کپاس	بال ورم (ہیلی کوور پا آرمیجرا)	۷۵	۵۰۰	۶۰۰-۱۰۰۰	۱۶	
بند گوبھی	ڈائمنڈ بیک ماتھ (پلیوٹیلا زائلوسٹیلا)	۳۰-۴۰	۲۰۰-۲۶۶	۴۰۰-۷۵۰	۷	
ٹماٹر	پھل میں سوراخ کرنے والے حشرات (ایچ-آرمیجرا)	۶۰-۷۵	۴۰۰-۵۰۰	۳۰۰-۶۰۰	۵	
مرچ	پھل میں سوراخ کرنے والے حشرات (ایچ-آرمیجرا اور اسپوڈوپٹیرا ایکزیگوا)	۵۰-۶۰	۳۳۳-۴۰۰	۳۰۰-۶۰۰	۵	
ارہر دال	پھلی میں سوراخ کرنے والے کمپلیکس (ایچ-آرمیجرا، پاڈ فلائی)	۵۰-۶۰	۳۳۳-۴۰۰	۵۰۰-۱۰۰۰	۱۵	۲۴
دھان	تنے میں سوراخ کرنے والے زرد حشرات (اسکرپوفیگا لیٹورا)، پتے موڑنے والے حشرات (نافالوکروسس میڈینالس)	۳۰-۵۰	۲۰۰-۳۳۳	۵۰۰	۳۷	
سویابین	تمباکو کے کیٹرپلر (اسپوڈوپٹیرا لیٹیورا)	۵۰	۳۳۳	۵۰۰	۳۶	
چنا	پھل میں سوراخ کرنے والے حشرات (ای-آرمیجرا)	۶۰-۷۵	۴۰۰-۵۰۰	۵۰۰	۱۹	

حشرات کش دوا کے چھڑکاؤ کی تکنیک سے متعلق اچھے طریقے:

ہدایات برائے استعمال:

اسپرے کو فصل کی سمت رکھیں اور تمام کھیت پر یکساں مقدار میں چھڑکاؤ کو یقینی بنائیں۔ درج بالا جدول میں ہدایات کے مطابق مختلف فصلوں میں نشانہ بنائے گئے حشرات کے خلاف چھڑکاؤ کرنے کے لئے زیادہ حجم والی اسپرے مشینوں کا مشورہ دیا جاتا ہے جیسے کہ نیپ سیک اسپریئر، راکنگ اسپریئر، فوٹ اسپریئر وغیرہ جن میں کھوکھلی تکونی ٹونٹی نصب ہو۔

موسمی کیفیات (عام طور پر):

صبح اور شام کے اوقات میں ترجیحی طور پر اس دوا کا چھڑکاؤ کریں۔ تیز ہوا والے دن یا بارش سے پہلے چھڑکاؤ نہ کریں۔

مٹی اور پانی (جہاں کہیں بھی قابل اطلاق ہو):

مٹی اور پانی کی کوئی خاص حالت تجویز نہیں کی گئی ہے۔

دوا کے چھڑکاؤ کے لیے فصل کا مرحلہ:

...

۳۔ پروڈکٹ شہد کی مکھیوں کے لیے زہریلا ہے، اس لیے دن میں جس وقت شہد کی مکھیوں کی تعداد زیادہ ہو اس وقت دوا کا چھڑکاؤ کرنے سے گریز کریں۔

۴۔ پروڈکٹ مچھلیوں، آبی نباتات اور بغیر ریڑھ کی ہڈی والے جانداروں کے لیے بہت زہریلا ہے، اس لیے آبی ذخائر میں اور اس کے آس پاس اس دوا کا چھڑکاؤ کرنے سے گریز کریں۔

استعمال شدہ خالی ڈبوں، سامان کا دھویا ہوا پانی، زائد بچے ہوئے سامان کو تلف کرنا:

۱۔ یہ ذمہ داری حشرات کش دوا تیار کرنے والی کمپنی، اور اس کا استعمال کرنے والے افراد اور آپریٹرز کی ہوگی وہ ماحول اور پانی کو آلودہ ہونے سے بچانے کے لئے دوا کے خالی ڈبے، زائد بچے ہوئے سامان اور مشینوں کے دھوئے ہوئے پانی کو مناسب طریقے سے تلف کریں۔

۲۔ دوا کے استعمال شدہ خالی ڈبوں کو باہر نہ چھوڑیں تاکہ ان کا دوبارہ استعمال نہ ہو سکے۔

۳۔ خالی ڈبوں کو توڑ کر انہیں آبادی سے دور گاڑ دیں۔

کیمیائی اجزا:

اجزاء		مقدار ٪وزن/وزن
انڈوکساکارب اے آئی	فعال جزو	۱۴.۵۰
غیر فعال اینانشومر	دیگر جزو	۶.۰۰
ایمارفس سلیکان ڈائی آکسائیڈ	دیگر جزو	۷.۰۰
پولی اتھوکزیلیٹیڈ پولی ارل فینول	دیگر جزو	۹.۰۰
پولی اتھوکزیلیٹیڈ پولی ارل فینول فاسفیٹ	دیگر جزو	۶.۰۰
ڈِسٹلڈ میتھائیل سوئیٹ	دیگر جزو	۵۷.۵۰
کل		۱۰۰.۰۰٪ وزن/وزن

خالی کنٹینر کو دوبارہ استعمال کرنا خطرناک ہے۔

Urdu

Actual size: 570 x 400 mm