PARAMVEER

Fipronil 0.3% G.R.
Insecticide

Read Leaflet Before Use.

Fipronil 0.3% GR is a granule insecticide containing Fipronil 0.3% active ingredient. It is recommended for control of Stem borer, Green leaf hopper, Rice leaf folder, Rice Gail Midge, White backed plant hopper & Whorl maggot pests in rice and early shoot borer, root borer and termites pests in Sugar cane..

Recommendation for use :

Crops	Common Name of the Pest	Dosage/Hectare A.I (gm)	Dosage/Hectare Formulation (kg)	Waiting Period between last application & harvest (In day)
Rice	Stem borer Brown plant hopper Green leaf hopper Rice Leaf Folder Rice Gall Midge White backed Plant hopper Whorl maggot	50-75	16.67-25.00	32 days
Sugar-cane	Early shoot borer Root borer Termites	75-100 75	25.0-33.3 25.0	9 months 9 months

Method of application and Equipment for use :

Rice : Recommended dosage for granule should be broadcasted using hand operated granule applicator or mechanical dispenser. Standing water of 2-3 cm depth should be available in the field. Keep water impounded for 2-3 day after application.

Sugarcane : Recommended dose should be applied in the furrows at planting time or 40-45 days after planting alongwith the furrows.

Precautions : Do not eat, drink, smoke or chew pan or tobacco while handing this product. Wash exposed body parts thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking and smoking. Do not inhale. Avoid contact with skin and eyes. Do not mix with bare hands. Use protective clothing like gloves, goggles, long coat or apron and mask while handling Destroy empty containers after use. Keep away from animal feed and foodstuff.

Symptoms Of Poisoning : Mainly consist of irritability, lethargy, muscle tremors and in extreme cases possibly convulsions may occur. Fipronil is a reversible GABA receptor inhibitor and these symptoms are reversible after termination of exposure.

First aid measures : If the insecticide is inhaled, get the victim into fresh air immediately. If breathing is stopped apply artificial respiration. If swallowed, induce vomiting by tickling back of the throat with finger. Flush the eyes with plenty of clean & cold water. Wash the skin with plenty of soap and water. Get medical attention.

Antidote : No specific antidote is known. Give symptomatic treatment.

Conditions to be specified for storage of insecticide :

1. The package containing insecticides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticides.
2. The rooms or premises meant for storing the insecticides shall be well built, dry, well-lit and well-ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with water vapour of insecticide

Disposal of used packages, surplus materials and washing of insecticide :

1. It shall be the duty of manufactures, formulators of insecticides and operators to dispose packages or surplus materials and washing in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution.
2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.
3. The packages shall be broken and buried away from habitation.

Chemical Composition :

Fipronil a.i.	0.3% w/w
Rhodamine dye	0.2% w/w
Binder (Sodium ligno sulphonate)	5.0% w/w
Carrier (Sand)	Q.S.
Total	**100.0% w/w**

Caution: Not to be used on crops other than those prescribed on label and leaflets. Destroy the container after use as directed on leaflet.

" DANGEROUS TO RE USE EMPTY CONTAINER "

परमवीर

फिप्रोनिल ०.३% जी.आर
(कीटनाशक)

इस्तेमाल से पहले संलग्न पत्रिका पढ़े ।

फिप्रोनिल ०.३% जीआर एक दानेदार कीटनाशक है जिसमें फिप्रोनिल ०.३% सक्रिय तत्व है। इसकी सिफारिश धान में लगने वाले कीटों तना छेदक, भूरा पौध फुदका, हरा पत्ती का तेला, धान का पत्ता मोड़क, धान गाल मिज, सफेद पीठ का पौध फुदका व गोम की मक्खी और गन्ने में पूर्व तना छेदक, जड़ छेदक और दीमक कीटों के नियंत्रण के लिए की गई है।

उपयोग के लिए सिफारिश :

फसल	कीटों के सामान्य नाम	मात्रा/हैक्टेयर स.त. (ग्रा.)	मात्रा/हैक्टेयर संरचना (कि.ग्रा.)	आखिरी छिड़काव तथा फसल काटने के बीच में अंतर (दिनों में)
धान	तना छेदक भुरा पौध फुदका हरा पत्ती का तेला धान का पत्ता मोड़क धान गाल मिज सफेद पीठ का पौध फुदका गोम की मक्खी	५०–७५	१६.६७–२५	३२ दिन
गन्ना	पूर्व तना छेदक	७५–१००	२५.००–३३.३	६ महीने
	जड़ छेदक	७५	२५.०	६ महीने

प्रयोग की विधि और उपयोग के लिये साम्रगी :

धान : सिफारिश की गई दानेदार की मात्रा को हाथों से चलाने वाले दानेदार ऐप्लिकेटर या यांत्रिक डिस्पेन्सर से बिखेरना चाहिए। धान की फसल में इसका प्रयोग करते समय २ से ३ सेन्टीमीटर पानी खड़ा रहने दीजिए। उपयोग के बाद पानी को २ से ३ दिन तक रहने दीजिये।

गन्ना : सिफारिश की गयी दानेदार की मात्रा गन्ने को बीजते समय नालियों (क्यारियों) में डाले या बीजाई के ४०–४५ दिन के बाद नालियों (क्यारियों) के साथ डालें।

सावधानियाँ : इस्तेमाल करते समय न तो खाएं–पीएं, न ही धूम्रपान करें तथा न ही पान या तम्बाकू आदि चबायें। इस्तेमाल के बाद और खाने–पीने या धूम्रपान के पहले शरीर के दूषित भागों को साबुन और पानी से अच्छी से धो लें। श्वसन द्वारा अन्दर न लें। त्वचा एवं आंखो को सम्पर्क से बचाएं। इसे नंगे हाथो से न मिलाएं। उपयोग के समय शरीर की सुरक्षा करने वाले वस्त्र पहनिये जैसे हाथों के दस्ताने, चश्मा, पूरे शरीर को ढकने वाला लंबा कोट या एप्रेन और मास्क। उपयोग के बाद खाली डिब्बों को नष्ट करें। इसे पशु आहार और खाद्य पदार्थों से दूर रखें।

विष बाधा के लक्षण : मुख्यतः चिड़चिड़ापन, उदासी, मांसपेशियों में ऐंठन। अत्याधिक प्रकोप की अवस्था में दौरे पड़ने की संभावनाएं हो सकती है। फिप्रोनिल गाबा रिसेप्टर अवरोधक है एवं कीटनाशक से सम्पर्क हटाते ही उपरोक्त लक्षण समाप्त हो जाते है और प्रभावित व्यक्ति पूर्वावस्था में आ जाता है।

प्राथमिक चिकित्सा : यदि कीटनाशक सांस द्वारा अंदर गयी हो तो मरीज को तुरंत खुली हवा में ले जाएं। श्वास रूकने लगे तो कृत्रिम श्वासोश्वास अमल में लाएं। कीटनाशक निगले जाने पर रोगी के गले के पिछले हिस्से में उंगली डालकर उल्टी करवाएं। आंखों को भरपूर एवं ठंडे पानी से धो लें। त्वचा को साबुन और पानी से अच्छी तरह धो लें। चिकित्सक से सलाह लें।

विषोपचार : इसकी कोई विशिष्ट दवा नहीं हैं। लक्षणानुसार उपचार कीजिए।

कीटनाशक के संग्रह हेतू निर्धारित शर्ते :

१. कीटनाशक रखे हुए डिब्बों/पैकेजस को अलग कमरों या जगहों में उन कमरों या जिनमें अन्य वस्तुएं रखी जाती है, उनसे दूर रखना चाहिए या अलग अलमारियों में ताला–चाबी लगाकर कीटनाशक की प्रमाण व प्रकार के हिसाब से रखें।
२. जिस कमरें या अलमारी में कीटनाशक का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, प्रकाशमय, हवादार तथा पर्याप्त आकार का होना चाहिए जिससे कीटनाशक के भाप से वातावरण प्रदूषित होने का खतरा न रहे।

उपयोग किए गए डिब्बों/पैकेजस, बचे हुए कीटनाशक तथा साधनों के धोवन का निपटारा :

१. यह कीटनाशक निर्माता तथा उपयोगकर्ता का कर्तव्य हैं कि डिब्बों/पैकेजस या बची हुई कीटनाशक तथा साधनों के धोवन का निपटारा सुरक्षित ढंग से करे जिससे वातावरण या पानी प्रदूषित न हो।
२. उपयोग किए गए डिब्बों/पैकेजस को बाहर न फेंके जिससे उनका दुबारा प्रयोग न हो।
३. उपयोग किए गए डिब्बों/पैकेजस को तोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ दें।

रासायनिक संरचना :

फिप्रोनिल सक्रिय तत्व	०.३% भार/भार
रोडामाईन डाई	०.२% भार/भार
बाइन्डर (सोडियम लिग्नो सल्फोनेट)	५.०% भार/भार
कैरियर (रेत)	मात्रानुसार
योग	१००.०% भार/भार

चेतावनी: इस लेबल/लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें। पत्रक पर दिए निर्देश अनुसार उपयोग के बाद खाली डिब्बों को नष्ट करें।

" खाली कंटेनर का दोबारा उपयोग करना खतरनाक है। "

પરમવીર

ફિપ્રોનિલ ૦.૩% જી.આર.
(જંતુનાશક)

ઉપયોગ પહેલા સંલગ્ન પત્રિકા અચૂક વાંચો.

ફિપ્રોનિલ ૦.૩% જીઆર એક દાણાદાર જંતુનાશક છે જેમાં ફિપ્રોનિલ ૦.૩% સક્રિય તત્વ છે. તે ડાંગરમાં પડતા તૃણ છેદક (વિંધિયા), ભૂરા સફેદ ફુદા, લીલા પાંદડાના કીટકો, ડાંગરના પાંદડાના કીડા, ડાંગરના ગેઈલ મીજ, સફેદ પીઠ વાળા છોડના ફુદા અને ડાંગરમાં જોવા મળતી સફેદ ઈયળ અને શેરડીમાં થડ ચૂસિયા, મૂળ ચૂસિયા તેમજ ઉધઈ જેવી જીવાંતનો નાશ કરવા માટે સૂચવવામાં આવે છે.

ઉપયોગ માટે ભલામણ:

પાક	કીટકોનું સામાન્ય નામ	પ્રમાણ/હેક્ટર સ.ત. (ગ્રામ)	પ્રમાણ/હેક્ટર બંધારણ (કિલો)	છેલ્લા છંટકાવ અને પાક લણવા વચ્ચેનું અંતર (દિવસમાં)
ડાંગર	તૃણ છેદક ભુરા સફેદ ફુદા લીલા પાંદડાના કીટકો ડાંગરના પાંદડાના કીડા ડાંગરના ગેઈલ મીજ સફેદ પીઠ વાળા છોડના ફુદા ડાંગરમાં જોવા	૫૦–૭૫	૧૬.૬૭–૨૫	૩૨ દિવસ
શેરડી	મળતી સફેદ ઈયળ	૭૫–૧૦૦	૨૫.૦૦–૩૩.૩	૬ મહિના
	થડ ચૂસિયા મૂળ ચૂસિયા	૭૫	૨૫.૦	૬ મહિના

ઉપયોગની રીત અને ઉપયોગ માટે જરૂરી સામગ્રી:

ડાંગર: સૂચવવામાં આવેલાં દાણાદાર જંતુનાશકના જથ્થાનો હાથથી ચાલતા દાણાદાર એપ્લિકેટર અથવા યાંત્રિક ડિસ્પેન્સરથી છંટકાવ કરવો જોઈએ. ડાંગરના પાકમાં તેનો ઉપયોગ કરતી વખતે ૨ થી ૩ સેન્ટીમીટર પાણી ભરેલુ હોવું જોઈએ. ઉપયોગ પછી પાણી ૨ થી ૩ દિવસ સુધી રહેવા દેવું જોઈએ.

શેરડી: સૂચવવામાં આવેલા દાણાદાર જંતુનાશકના જથ્થાને શેરડી વાવતી વખતે ક્યારામાં નાખો અથવા વાવેતરના ૪૦-૪૫ દિવસ પછી ક્યારમાં નાખો.

સાવચેતી: ઉપયોગ કરતી વખતે કોઈપણ વસ્તુ ખાવી કે પીવી નહીં તેમજ ધૂમ્રપાન કરવું નહીં અથવા પાણી કે તમાકુનું સેવન કરવું નહીં. ઉપયોગ કર્યા પછી અને કોઈપણ વસ્તુ ખાતી-પીતી વખતે અથવા ધૂમ્રપાન કરતા પહેલા શરીરના દૂષિત ભાગોને સાબુ અને પાણીથી ખૂબ સારી રીતે સાફ કરો. શ્વાસમાં અંદર ન જાય તેનું ધ્યાન રાખવું. ત્વચા અને આંખોના સંપર્કમાં ન આવે તેનું ધ્યાન રાખવું. ખુલ્લા હાથે ઉપયોગ ન કરવો. ઉપયોગ કરતી વખતે હાથના મોજા, ચશ્મા અને આખુ શરીર ઢંકાઈ જાય તેવા કોટ, એપ્રન અને માસ્ક સહિત શરીરની સુરક્ષા થાય તેવા વસ્ત્રો પહેરવા. ઉપયોગ કર્યા પછી ખાલી ડબાનો નાશ કરવો. તેને પશુઓના આહાર અને ખાદ્ય પદાર્થોથી દૂર રાખો.

ઝેરી અસરના લક્ષણો: મુખ્યત્વે વ્યક્તિને બળતરા અને માંસપેશીઓમાં ખેંચાણ આવે છે તેમજ વધુ અસર થઈ જાય તો આંચકી આવે છે. ફિપ્રોનિલ ગાબા રિસેપ્ટર અવરોધક છે અને જંતુનાશકથી સંપર્ક હટાવતા જ આ લક્ષણો સમાપ્ત થઈ જાય અને અસરગ્રસ્ત વ્યક્તિ ફરી પૂર્વાવસ્થામાં આવી શકે છે.

પ્રાથમિક સારવાર: જો જંતુનાશક શ્વાસમાં અંદર જાય તો દર્દીને તુરંત ખુલ્લી હવામાં લઈ જાવ. શ્વાસ રોકાવા લાગે તો કૃત્રિમ શ્વાસોચ્છવાસ અમલમાં લાવો. જંતુનાશક ગળી ગયા હોય તેવા દર્દીને ગળાની નીચેના ભાગમાં આંગળી નાખીને ઉલટી કરાવવી. આંખોને વિપુલ પ્રમાણમાં ઠંડા પાણીથી સાફ કરવી. ત્વચાને સાબુ અને પાણીથી સારી રીતે સાફ કરવી. ડોક્ટરની સલાહ લઈને આગળ વધવું.

વિષનાશક: કોઈ વિશેષ દવા નથી. લક્ષણ અનુસાર ઈલાજ કરવો.

જંતુનાશકના સંગ્રહ સંબંધિત શરતો:

૧. જંતુનાશક રાખતી વખતે ડબ્બા/પેકેજને અલગ અલગ રૂમમાં અથવા જગ્યાએ જ્યાં અન્ય કોઈ વસ્તુ રાખવામાં આવતી હોય ત્યાં દૂર રાખો અથવા તેને કબાટમાં તાળુ લગાવીને અલગ રાખો. જંતુનાશકના પ્રમાણ અને તેના પ્રકારના આધારે સંગ્રહ કરવો.
૨. જે રૂમ અથવા કબાટમાં જંતુનાશકનો સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો હોય ત્યાં જગ્યા સારી રીતે બનાવેલી, સુકી, પુરતા પ્રકાશ વાળી, હવાની અવરજવર વાળી અને પુરતી જગ્યા વાળી હોવી જોઈએ જેથી જંતુનાશકની બાષ્પથી વાતાવરણ દૂષિત થવાનું જોખમ ન રહે.

ઉપયોગમાં લીધેલા ડબા/પેકેજ, વધેલા જંતુનાશકોનો નિકાલ અને ઉપયોગમાં લીધેલા સાધનો ધોવા:

૧. જંતુનાશક ઉત્પાદક અથવા વપરાશકર્તાની ફરજ છે કે ડબા/પેકેજ અથવા વધેલા જંતુનાશકનો નિકાલ કરવો અને તેના ઉપયોગ માટેના સાધનો બરાબર સાફ કરીને તેને સુરક્ષિત રીતે રાખવા જેથી વાતાવરણ અથવા પાણી પ્રદૂષિત ન થાય.
૨. ઉપયોગમાં લીધેલા ડબા/ પેકેજને બહાર ન ફેંકો જેથી તેનો ફરી ઉપયોગ ટાળી શકાય.
૩. ઉપયોગમાં લીધેલા ડબા/ પેકેજને તોડીને વસ્તીથી દૂર જમીનમાં દાટી દેવા.

રાસાયણિક બંધારણ:

ફિપ્રોનિલ સક્રિય તત્વ	૦.૩% %/%
રોડામાઈન ડાઈ	૦.૨% %/%
બાઈન્ડર (સોડિયમ લિગ્નો સલ્ફોનેટ)	૫.૦% %/%
કેરિયર (રેતી)	પ્રમાણસર
કુલ	૧૦૦.૦% %/%

સાવધાની: લેબલ અને પત્રિકાઓ પર સૂચવવામાં આવેલ સિવાયના પાકો પર ઉપયોગ ન કરવો. પત્રિકા પરના નિર્દેશ મુજબ ઉપયોગ કર્યા પછી કન્ટેનરનો નાશ કરો.

"ખાલી ડબ્બા ફરીથી ઉપયોગ કરવાનું ખતરનાક છે."

DIRECTION FOR USE

FOR AGRICULTURAL USE

कृषि उपयोग के लिए

Read Leaflet Before Use

इस्तेमाल से पहले संलग्न पत्रिका पढ़ें।



Marketed by:
GUJARAT INSECTICIDES LIMITED
Plot No.805/806,GIDC Estate, Ankleshwar
Dist. Bharuch, Gujarat - 393002.

Manufactured by:Saraswati Agro Chemicals (India) Pvt. Ltd.Regd. Office: Village Dao Majra, Kharar Kurali Road, Distt.S.A.S.Nagar (Mohali),Punjab – 140301.Factory:Lane-2, Phase-1,SIDCO Industrial Complex,Bari Brahmana, Distt. Jammu (J&K)

विक्रेताः **गुजरात इन्सेक्टीसाईडस् लिमिटेड**
प्लॉट नं.:८०५/८०६, जी.आई.डी.सी.एस्टेट अंकलेश्वर, जिला– भरूच,गुजरात–३९३००२

निर्माता :सरस्वती एग्रो केमिकल्स (इंडिया) प्रा. लि.
रजि. ऑफिस : गाँव दाव माजरा, खरड कुरली रोड, जिला एस.ए.एस. नगर (मोहाली), पंजाब – १४०३०१.
फैक्ट्रीः लेन–२, फेस–१, सिडको इण्डस्ट्रीयल कॉम्प्लेक्स, बारी ब्राम्हना, जिला जम्मू (जे एण्ड के)

For any complaints, contact Customer Care Executive at Gharda Chemicals Limited, Gharda House, 48 Hill Road, Bandra (W), Mumbai - 400050. INDIA
Tel.: 022 66265998 / 66265999
Email: consumercare@gharda.com
Website: www.gharda.com



JM.12.25-01

Actual Size - 417mm X 405mm
Date - 18.12.2025

ਪਰਮਵੀਰ

ਫਿਪਰੋਨਿਲ ੦.੩% ਜੀ.ਆਰ.
(ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ)

ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਪੱਤਰਿਕਾ ਪੜ੍ਹੋ।

ਫਿਪਰੋਨਿਲ ੦.੩% ਜੀਆਰ ਇੱਕ ਦਾਣੇਦਾਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਪਰੋਨਿਲ ੦.੩% ਸਕ੍ਰਿਅ ਤੱਤ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕੀਟਾਂ ਤਣਾ ਛੇਦਕ, ਭੂਰਾ ਪੌਦ ਫੁਦਕਾ, ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਤੇਲਾ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਪੱਤਾ ਮੋੜਕ, ਝੋਨਾ ਗਾਲ ਮਿਜ਼, ਸਫੇਦ ਪਿੱਠ ਦਾ ਪੌਦ ਫੁਦਕਾ ਅਤੇ ਗੋਮ ਮੱਖੀ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵ ਤਣਾ ਛੇਦਕ, ਜੜ੍ਹ ਛੇਦਕ ਅਤੇ ਦੀਮਕ ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼:

ਫਸਲ	ਫ਼ਸਲ ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਆਮ ਨਾਮ	ਮਾਤਰਾ/ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਕ੍ਰਿਅ ਤੱਤ (ਗ੍ਰਾ.)	ਮਾਤਰਾ/ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੰਰਚਨਾ (ਕਿ.ਗ੍ਰਾ.)	ਅੰਤਿਮ ਛਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਕੱਟਣ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ (ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ)
ਝੋਨਾ	ਤਣਾ ਛੇਦਕ, ਭੂਰਾ ਪੌਦ ਫੁਦਕਾ, ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਤੇਲਾ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਪੱਤਾ ਮੋੜਕ, ਝੋਨਾ ਗਾਲ ਮਿਜ਼,	੫੦-੭੫	੧੬.੬੭-੨੫.੦੦	੩੨ ਦਿਨ
ਗੰਨਾ	ਸਫੇਦ ਪਿੱਠ ਦਾ ਪੌਦ ਫੁਦਕਾ ਅਤੇ ਗੋਮ ਦੀ ਮੱਖੀ ਗੰਨੇ ਵਿੱਚ	੭੫-੧੦੦	੨੫.੦-੩੩.੩	੯ ਮਹੀਨੇ
	ਪੂਰਵ ਤਣਾ ਛੇਦਕ, ਜੜ੍ਹ ਛੇਦਕ	੭੫	੨੫.੦	੯ ਮਹੀਨੇ

ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ:

ਝੋਨਾ: ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾਣੇਦਾਰ ਐਪਲੀਕੇਟਰ ਜਾਂ ਯਾਂਤਰਿਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਨਾਲ ਖਿਲਾਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ੨ ਤੋਂ ੩ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ੨ ਤੋਂ ੩ ਦਿਨ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦਿਓ।

ਗੰਨਾ: ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਸਮੇਂ ਕਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ੪੦-੪੫ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਓ।

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ: ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਖਾਓ-ਪੀਓ, ਨਾ ਹੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਓ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਨ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਚਬਾਓ। ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਜਾਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ। ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਖਿਚੋ। ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਇਸਨੂੰ ਨੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਾਓ। ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਇਸਨੂੰ ਨੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਾਓ। ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੋ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ, ਚਸ਼ਮਾ, ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢਕਣ ਵਾਲਾ ਲੰਬਾ ਕੋਟ ਜਾਂ ਐਪਰਨ ਅਤੇ ਮਾਸਕ। ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਆਹਾਰ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।

ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ੍ਹਣ ਦੇ ਲੱਛਣ: ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੜਚਿੜਾਪਣ, ਉਦਾਸੀ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕੜਣ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਪਰੋਨਿਲ ਗਾਬਾ ਰਿਸੈਪਟਰ ਅਵਰੋਧਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਲੱਛਣ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਢਲੀ ਚਿਕਿਤਸਾ: ਜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਾਹ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਸਾਹ ਰੁਕਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਬਨਾਵਟੀ ਸਾਹ ਦਿਓ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਿਗਲੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਪਾ ਕੇ ਉਲਟੀ ਕਰਵਾਓ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧੋ ਲਓ। ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲਓ। ਚਿਕਿਤਸਕ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਚਾਰ: ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਚਾਰ ਕਰੋ।

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ:

੧. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ/ਪੈਕੇਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਮਰਿਆਂ ਜਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾ-ਚਾਬੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖੋ।

੨. ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਕਾ, ਰੋਸ਼ਨਦਾਰ, ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਭਾਪ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਰਹੇ।

ਵਰਤੇ ਗਏ ਡੱਬੇ/ਪੈਕੇਜਿਸ, ਬਚੇ ਹੋਏ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਨਿਪਟਾਉਣਾ:

੧. ਇਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਡੱਬੇ/ਪੈਕੇਜਿਸ ਜਾਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ ਨਿਪਟਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

੨. ਵਰਤੇ ਗਏ ਡੱਬੇ/ਪੈਕੇਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਸੁੱਟੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

੩. ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੱਬੇ/ਪੈਕੇਜਿਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਦਿਓ।

ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੰਰਚਨਾ:

ਫਿਪਰੋਨਿਲ ਸਕ੍ਰਿਅ ਤੱਤ	੦.੩% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਰੋਡਾਮਾਇਨ ਡਾਈ	੦.੨% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਬਾਇੰਡਰ (ਸੋਡੀਅਮ ਲਿਗਨੋ ਸਲਫੇਟ)	੫.੦% ਭਾਰ/ਭਾਰ
ਕੈਰੀਅਰ (ਰੇਤ)	ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਜੋੜ	**੧੦੦.੦੦% ਭਾਰ/ਭਾਰ**

ਸਾਵਧਾਨੀ:ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਪਰਚੇ ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ।

''ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।''

परमवीर

फिप्रोनिल ०.३% जी.आर.
(कीटकनाशक)

वापर करण्यापूर्वी पुस्तिका वाचा.

फिप्रोनिल ०.३% जीआर हे एक दाणेदार कीटकनाशक आहे ज्यामध्ये फिप्रोनिल ०.३% सक्रिय घटक आहे. याची शिफारस भातावरील खोड पोखरणारी अळी, तपकिरी प्लांट हॉपर, हिरवा लिफ हॉपर, राईस लिफ हॉपर, भातावरील गॉल माशी, पांढऱ्या पाठीचा प्लांट हॉपर आणि वर्ल मॅगट किडी आणि ऊसामधील शेंडे पोखरणारी अळी, मूळ पोखरणारी अळी आणि वाळवी किडीच्या नियंत्रणासाठी केली जाते.

वापरासाठी शिफारस:

पिके	किडीचे सामान्य नाव	मात्रा/हैक्टेयर स.त. (ग्रा.)	मात्रा/हैक्टेयर संरचना (कि.ग्रा.)	अंतिम फवारणी ते कापणी दरम्यान प्रतीक्षा कालावधी (दिवस)
भात	खोड पोखरणारी अळी, तपकिरी प्लांट हॉपर, हिरवा लिफ हॉपर, राईस लिफ फोल्डर, राईस गॉल मिज, पांढऱ्या पाठीचा प्लांट हॉपर, वर्ल मॅगट	५०—७५	१६.६७—२५	३२ दिन
ऊस	आरंभिक शेंडे पोखरणारी अळी	७५—१००	२५.००—३३.३	६ महीने
	मूळ पोखरणारी अळी वाळवी	७५	२५.०	६ महीने

फवारणीची पद्धत आणि वापरासाठी उपकरण:

भात: दाण्यांसाठी शिफारसकृत मात्रा हाताने संचालित ग्रॅन्युल ॲप्लिकेटर किंवा मेकॅनिकल डिस्पेन्सर वापरुन पसरावी. शेतामध्ये २-३ सेंमी उभे पाणी असले पाहिजे. फवारणीनंतर २-३ दिवस पाणी राहू द्यावे.

ऊस: शिफारस केलेल्या प्रमाणात मात्रा ओळींमध्ये रोवणीच्या वेळी किंवा रोवणीनंतर ४०-४५ दिवसांनी ओळीलगत द्यावी.

खबरदारी: हे उत्पादन हाताळताना काहीही खाऊ, पिऊ, चघळू किंवा पान-तंबाकू खाऊ नका. हाताळल्यानंतर आणि खाणे, पिणे आणि धूम्रपान करण्यापूर्वी शरीराचे उघडे भाग साबण आणि पाण्याने स्वच्छ धुवावेत. हुंगू नका. त्वचा आणि डोळ्यांसोबत संपर्क टाळा. उघड्या हातांनी मिसळू नका. हाताळताना सुरक्षात्मक कपडे परिधान करा जसे ग्लोव्ज, गॉगल्स, लांब कोट किंवा अॅप्रन आणि मास्क. रिकामे कंटेनर्स वापरानंतर नष्ट करा. पशु खाद्य आणि अन्नपदार्थांपासून दूर ठेवा.

विषबाधेची लक्षणे: प्रामुख्याने चिडचिड, थकवा, स्नायूंमध्ये कंप आणि टोकाच्या स्थितीमध्ये संभवतः आचके उद्‌भवू शकतात. फिप्रोनील हे एक परिवर्तनीय गाबा रिसेप्टर इनहिबीटर आहे आणि ही लक्षणे संपर्क समाप्त झाल्यानंतर परिवर्तनीय असतात.

प्रथमोपचार: किटकनाशक हुंगल्यास, रुग्णाला तत्काळ ताज्या हवेत न्या. श्वसन थांबले असल्यास कृत्रिम श्वसन द्या. पोटात गेल्यास, घशाच्या मागील बाजूस बोटाने दाबून उलटी करवा. डोळे भरपूर स्वच्छ आणि थंड पाण्याने धुवा.. त्वचा भरपूर साबण आणि पाण्याने धुवा. वैद्यकीय मदत घ्या.

प्रतिउपाय: कोणतेही विशिष्ट प्रतिउपाय नाहीत. लक्षणांनुसार उपचार करावेत.

किटकनाशक साठवणीसाठी अटी:

१. किटकनाशक असलेले पॅकेज स्वतंत्र खोल्या किंवा इमारतींमध्ये अन्य वस्तू साठवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खोल्या किंवा इमारतींपासून दूर साठवावे किंवा किटकनाशकाचे प्रमाण आणि स्वरुप यांच्यानुसार कुलूपबंद अवस्थेत स्वतंत्र कपाटांमध्ये ठेवावे.

२. किटकनाशक साठवणीसाठी असलेल्या खोल्या किंवा इमारती चांगल्या बांधलेल्या, कोरड्या, प्रकाशमान आणि हवेशीर आणि पुरेशा आकारमानाच्या असाव्यात जेणेकरुन किटकनाशकाचे पाण्याच्या वाफेसोबत प्रदूषण होणार नाही.

वापरलेली पाकिटे, शिल्लक साहित्य आणि किटकनाशक धुवणाची विल्हेवाट:

१. किटकनाशकाचे निर्माता, फॉर्म्युलेटर्स आणि ऑपरेटर्स यांचे कर्तव्य राहील की त्यांनी पॅकेजेस किंवा शिल्लक साहित्य आणि धुवणाचं पाणी सुरक्षित पद्धतीने नष्ट करावे जेणेकरुन पर्यावरण किंवा पाण्याचे प्रदूषण होणार नाही.

२. वापरलेली पाकिटे उघड्यावर टाकू नयेत म्हणजे त्यांचा पुनर्वापर टाळता येईल.

३. पाकिटे तोडावीत आणि वस्तीपासून दूर पुरून टाकावीत.

रासायनिक संरचना:

फिप्रोनिल स.त.	०.३% भार/भार
ऱ्होडामाईन डाय	०.२% भार/भार
बाईंडर (सोडीयम लिग्नो सल्फोनेट)	५.०% भार/भार
वाहक (वाळू)	आवश्यक प्रमाणात
एकूण	१००.०% भार/भार

खबरदारी : लेबल व पत्रकांवर लिहून दिलेल्या पिकांखेरीज इतर पिकांवर वापरू नये. पत्रकावर सांगितल्याप्रमाणे वापरल्यानंतर कंटेनर नष्ट करा.

" रिकामे कंटेनर पुन्हा वापरणे धोकादायक आहे."

పరమవీర్

ఫి[ప్రోనిల్ 0.3% జీ.ఆర్.
(కీటకనాశిని)

ఉపయోగించడానికి ముందు కరపత్రం చదవండి:

ఫి[ప్రోనిల్ 0.3 శాతం జీఆర్ గింజలతో కూడిన కీటకనాశిని. దీనిలో ఫి[ప్రోనిల్ 0.3 శాతం స[క్రియ పదార్థం ఉంది. వరిని ఆశించే కాండం తొలిచే పురుగు, [బౌన్ ప్లాంట్ హాపర్, [గీన్ లీఫ్ హాపర్, వరి ఆకు ముడత పురుగు, రైస్ గెయిల్ మిడ్జ్, వైట్ బ్యాక్డ్ ప్లాంట్ హాపర్ మరియు వోర్ల్ మగ్గోట్ మరియు చెరకుని ఆశించే ఎర్లీ షూట్ బోరర్, వేళ్లు తొలిచే పురుగు మరియు చెదల్ని నియం[త్రించడానికి సిఫారసు చేయబడుతుంది.

ఉపయోగించడానికి సిఫారసు:

పంటలు	తెగులు సాధారణ నామం	మోతాదు/హెక్టారు ఏ.ఐ (గ్రా)	మోతాదు/హెక్టారు సూత్రీకరణ (కేజీ)	చివరిసారి ఉపయోగించిన సమయానికి మరియు కోతలకు మధ్య వేచి ఉండే సమయం (రోజుల్లో)
వరి	కాండం తొలిచే పురుగు, బ్రౌన్ ప్లాంట్ హాపర్, గ్రీన్ లీఫ్ హాపర్, వరి ఆకు ముడత పురుగు, వరి గాల్ మిడ్జ్, వైట్ బ్యాక్డ్ ప్లాంట్ హాపర్, వోర్ల్ మగ్గోట్	50-75	16.67-25.00	32 రోజులు
చెరకు	ఎర్లీ షూట్ బోరర్,	75-100	25.0-33.3	9 నెలలు
	వేళ్లు తొలిచే పురుగు, చెదలు	75	25.0	9 నెలలు

ఉపయోగించే విధానం మరియు ఉపయోగించాల్సిన సామ[గి:

వరి- చేతితో ఉపయోగించే [గాన్యూల్ అప్లికేటర్ లేదా మెకానికల్ డిస్పెన్సర్‌ని ఉపయోగించి సిఫారసు చేసిన [గాన్యూల్ మోతాదుని చల్లాలి. పంటలో 2-3 సెం.మీ లోతులో నీరు నిలిచి ఉండాలి. ఉపయోగించిన తర్వాత 2-3 రోజులు నీరు నిలిచి ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలి.

చెరకు: నాటే సమయంలో లేదా నాటిన తర్వాత 40-45 రోజుల తర్వాత గాళ్లల్లో సిఫారసు చేసిన మోతాదు ఉపయోగించాలి.

ముందు జా[గత్తలు: ఈ ఉత్పత్తిని నిర్వహించేటప్పుడు ఏదీ తినరాదు, తాగరాదు, పొగ తాగరాదు లేదా కిళ్లీ లేదా పొగాకు నమలరాదు. ఉత్పత్తిని ఉపయోగించిన తర్వాత మరియు ఏదైనా తినడానికి, తాగడానికి మరియు పొగ తాగడానికి ముందు బహిర్గతమైన శరీర భాగాల్ని సబ్బు, నీటితో బాగా కడగాలి. చర్మం, కళ్లకు తగలరాదు. ఖాళీ చేతులతో కలపరాదు. ఉత్పత్తిని నిర్వహించేటప్పుడు గ్లోవ్స్, గూగుల్స్, పొడుగు కోట్ లేదా ఆ[ప్రాన్ మరియు మాస్క్ వంటి రక్షణనిచ్చే దుస్తుల్ని ధరించాలి. ఉపయోగించిన తర్వాత ఖాళీ కంటైనర్లని నాశనం చేయాలి. ఆహార పదార్థాలు, జంతువుల ఆహార పదార్థాలకు దూరంగా ఉంచాలి.

విషపూరితం లక్షణాలు: చికాకు, బద్ధకం, ఒణుకు మరియు తీ[వమైన కేసుల్లో అయితే మూర్ఛలు వంటి లక్షణాలు కలగవచ్చు. ఫి[ప్రోనిల్ గాబా రిసెప్టర్‌ని నిరోధిస్తుంది మరియు బహిర్గతం కావడం పూర్తయిన తర్వాత ఈ లక్షణాలు తగ్గిపోతాయి.

[ప్రథమ చికిత్స చర్యలు: కీటకనాశినిని పీల్చినట్లైతే, బాధితుడ్ని వెంటనే తాజా గాలిలోకి తీసుకురావాలి. ఊపిరి తీసుకోవడం ఆగిపోతే కృత్రిమ శ్వాశ అందచేయాలి. మింగితే, చేతితో గొంతు లోపల చేయి పెట్టి వాంతి తెప్పించాలి. కళ్లని కావల్సినంత శు[భమైన, చల్లని నీటితో కడగాలి. చర్మాన్ని కావల్సినంత నీరు, సబ్బుతో కడగాలి. డాక్టర్‌ని సం[ప్రదించాలి.

విరుగుడు: [ప్రత్యేకించి విరుగుడు ఏదీ లేదు. లక్షణాల [ప్రకారం చికిత్స చేయాలి.

కీటకనాశినిని భ[ద్రపరిచే పరిస్థితులు:

1. కీటకానిశినిలు ఉన్న ప్యాకేజీని ఇతర వస్తువుల్ని ఉంచే గదులు లేదా [ప్రాంగణాలకు దూరంగా వేరు గదులు లేదా [ప్రాంగణాల్లో భ[ద్రపర్చాలి లేదా కీటకనాశిని స్వభావం మరియు పరిమాణాన్ని బట్టి అల్మైరాలో ఉంచి తాళం వేయాలి.
2. కీటకనాశినిల్ని భ[ద్రపర్చడానికి ఉద్దేశ్యించబడిన గదులు లేదా [ప్రాంగణాలు చక్కటి గాలి, వెలుతురుతో, పొడిగా, కావల్సిన కొలతలతో ఉండాలి. కీటకనాశిని యొక్క నీటి ఆవిరితో కలుషితం కాకుండా తగిన కొలతల్ని కలిగి ఉండాలి.

ఉపయోగించిన ప్యాకేజీలు, మిగులు సామ[గి, కీటకనాశినిని కడిగిన నీటిని పడవేయడం:

1. పర్యావరణం లేదా నీటి కాలుష్యం కలగకుండా ప్యాకేజీలు లేదా మిగులు సామ[గి మరియు కడిగిన నీటిని సురక్షితమైన విధానంలో కీటకనాశిని తయారీదారులు, సూ[త్రీకరణధారులు, ఆపరేటర్లు పడవేయాల్సిన బాధ్యతని కలిగి ఉన్నారు.
2. ఉపయోగించిన ప్యాకేజీలు తిరిగి ఉపయోగించకుండా నివారించడానికి వాటిని బయట వదిలి వేయరాదు.
3. ప్యాకేజీల్ని విరగ్గొట్టి, నివాసిత [ప్రాంతాలకు దూరంగా పాతి పెట్టాలి.

రసాయన మి[శమం:

ఫి[ప్రోనిల్ ఏ.ఐ.	0.3% డబ్ల్యూ/డబ్ల్యూ
రోడమైన్ డై	0.2% డబ్ల్యూ/డబ్ల్యూ
బైండర్ (సోడియం లిగ్నో సల్ఫోనేట్)	4.0% డబ్ల్యూ/డబ్ల్యూ
కారియర్ (ఇసుక)	క్యూ.ఎస్.
మొత్తం	100.00% డబ్ల్యూ/డబ్ల్యూ

జాగ్రత్త: లేబుల్ మరియు కరపత్రాలపై సూచించబడిన పంటలు కాకుండా ఇతర పంటలపై ఉపయోగించకూడదు. కరపత్రముపై నిర్దేశించబడిన విధంగా ఉపయోగించబడిన తరువాత డబ్బాలను నాశనం చేయండి.

''ఖాళీ డబ్బాలని తిరిగి ఉపయోగించడం [ప్రమాదం''

پرم ویر ۰.۳٪ جی آر

فپرونل 0.3% جی آر
(جراثیم کش)

استعمال سے پہلے منسلک کتابچہ پڑھیں۔

فپرونل 0.3% جی آر ایک دانے دار کیڑے مار دوا ہے، جس میں فپرونل 0.3% فعال جز ہے۔ اس کی سفارش دھان میں لگنے والے کیڑوں تنا چھیدک، بھورا پودھ پھدکا، ہرا پتی کا تیلا، دھان کا پتا موڑک، دھان گال مج، سفید پیٹھ کا پودھ پھدکا و گوم کی مکھی اور گنے میں قبل تنا چھیدک، جڑ چھیدک اور دیمک کے کیڑوں پر قابو پانے کے لیے کی گئی ہے۔

استعمال کے لئے سفارش:

فصل	کیڑوں کے عام نام	مقدار/فی ہیکٹیر کیمیائی جزا (گرام)	مقدار/فی ہیکٹیر ترکیب (کلوگرام)	آخری چھڑکاؤ نیز فصل کاٹنے کے درمیان فرق (دنوں میں)
دھان	تنا چھیدک، بھورا پودھ پھدکا، ہرا پتی کا تیلا، دھان کا پتا موڑک، دھان گال مج، سفید پیٹھ کا پودھ پھدکا و گوم کی مکھی	50-75	16.67-25	32دن
گنا	قبل تنا چھیدک،	75-100	25.00-33.3	6مہینے
	جڑ چھیدک	75	25.0	6مہینے

طریقۂ استعمال اور استعمال کے لئے اشیاء

دھــــان: سفارش کی گئی ہے کہ دانے دار دوا کی مقدار کو ہاتھوں سے چلانے والے دانے دار اپلی کیٹر یا مشینی ڈسپینسر سے چھڑکاؤ کرنا چاہئے۔ دھان کی فصل میں اس استعمال کرتے وقت 2 سے 3 سینٹی میٹر پانی کھیت میں کھڑا رہنے دیجئے۔ استعمال کے بعد پانی کو 2 سے 3 دن تک رہنے دیجئے۔

گــنا: سفارش کی گئی ہے کہ دانے دار دوا کی مقدار گنے کے بیج بوتے وقت نالیوں (کیاریوں) میں ڈالیں یا بیج دبانے کے 40-45 دن کے بعد نالیوں (کیاریوں) کے ساتھ ڈالیں۔

احتیــــاط: استعمال کرتے وقت نہ تو کھائیں، نہ پئیں، نہ ہی بیڑی سگریٹ پئیں اور نہ ہی پان یا تمباکو وغیرہ چبائیں۔ استعمال کے بعد کھانے پینے یا بیڑی سگریٹ پینے سے پہلے جسم کے آلودہ اعضاء کو صابن اور پانی سے اچھی طرح دھولیں۔ سانس کے ذریعے اندر نہ جانے دیں۔ جلد اور آنکھوں کو دوا سے بچائیں۔ دوا کو ننگے ہاتھوں سے نہ ملائیں۔ استعمال کے وقت حفاظتی کپڑے پہنیں، مثلاً ہاتھوں کے دستانے، چشمہ، پورے جسم کو ڈھکنے والا لمبا کوٹ یا ایپرن اور ماسک۔ استعمال کے بعد خالی ڈبوں کو ضائع کردیں۔ اسے مویشیوں کے چارے اور کھانے پینے کی اشیا سے دور رکھیں۔

زھــر کـی عـلامـات: عام طور پر چڑ چڑا پن، بے ہوشی، پٹھوں میں اینٹھن، زیادہ اثر ہونے کی صورت میں دورے پڑنے کے امکانات ہیں۔ فپرونل مانع گابا ریسیپٹر ہے اور کیڑے مار دوا کا اثر کم ہوتے ہی درج بالا علامات ختم ہوجاتی ہیں اور متاثرہ شخص پہلے جیسی حالت میں آجاتا ہے۔

ابـتـدائـی عـلاج: اگر کیڑے مار دوا سانس کے ذریعے اندر گئی ہے تو مریض کو فوراً کھلی ہوا میں لے جائیں۔ سانس رکنے لگے تو مصنوعی سانس دلانے کا عمل کریں۔ کیڑے مار دوا نگل جانے پر مریض کے گلیکے اندرونی حصے میں انگلی ڈال کر قے کرائیں۔ آنکھوں میں چلے جانے پر آنکھوں کو بہت زیادہ ٹھنڈے پانی سے دھوئیں۔ جلد کو صابن اور پانی سے اچھی طرح دھولیں۔ معالج سے صلاح لیں۔

تریاق: اس کی کوئی مخصوص دوا نہیں ہے۔ علامات کے مطابق علاج کریں۔

کیڑے مار دوا کو محفوظ کرنے کے لیے شرائط:

1. کیڑے مار دوا کے ڈبوں/پیک کو علیحدہ کمروں یا مقامات میں، جہاں دیگر اشیاء رکھی جاتی ہیں، ان سے دور رکھنا چاہئے یا علیحدہ کمروں کی مقفل الماریوں میں کیڑے مار دوا کی تصدیق نیز قسم کے حساب سے رکھنا چاہئے۔
2. جس کمرے یا الماری میں کیڑے مار دوا کو محفوظ کرنا ہو اس کی تعمیر بہتر ہونی چاہئے، کمرہ خشک، روشن، ہوادار اور مناسب رقبہ کا ہونا چاہئے تاکہ کیڑے مار دوا کے ابخارات سے ماحول کے آلودہ ہونے کا خطرہ نہ ہو۔

استعمال کئے گئے ڈبے/پیکٹس، بچی ہوئی کیڑے مار دوا اور چیزوں کو دھونے کے پانی کا نمٹارہ:

1. کیڑے مار دوا کے بنانے والے اور استعمال کرنے والے کا فرض ہے کہ ڈبوں/پیکٹس یا بچی ہوئی کیڑے مار دوا نیز استعمال کئے گئے آلات کو دھونے کے بعد اس کے پانی کا نمٹارہ محفوظ طریقے سے کریں تاکہ ماحول آلودہ یا پانی زہریلا نہ ہو۔
2. استعمال کئے جانے کے بعد خالی ڈبوں/پیکٹس کا باہر نہ پھینکیں جس سے ان کا دوبارہ استعمال نہ ہو۔
3. استعمال کئے گئے ڈبوں/پیکٹ کو توڑ کر آبادی سے دور زمین میں دفن کردیں۔

ترکیب کیمیائی:

فِپرونل فعال اجزاء	0.300فیصد وزن/وزن
روڈمن ڈائی	0.200فیصد وزن/وزن
بائنڈیر "سوڈیم لگنو سلفونیٹ"	5.000فیصد وزن/وزن
کیرئیر (ریت)	مقدار کے مطابق
میزان	**100.000فیصدوزن/وز**

احتیاطی بیان: لیبل اور ہدایت کی پرچی پر دئیے گئے مقاصد کے علاوہ کسی اور مقصد اور فصلوں کے لئے اس دوا کا استعمال نہ کریں۔ ہدایت کی پرچی پر دی گئی ہدایات کے مطابق استعمال کے بعد دوا کے خالی ڈبوں کو تلف کردیں۔

خالی کنٹینر کو دوبارہ استعمال کرنا خطرناک ہے۔